

**Aus der Universitätsklinik für Psychische und Nervenkrankhe
in Bonn**

Direktor: Prof. Dr. Pohlisch.

Untersuchung der Sippe eines Reckling-
hausen-Kranken mit besonderer Berück-
sichtigung der Genese der gefundenen
Anomalien und der Frage der Vererbung.



INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich Wilhelms-Universität zu Bonn



Vorgelegt von

Dr. med. dent P. Hall

Arzt

aus Zweibrücken bei Aachen.

B O N N 1937

Anton Brand, Bonn

Gedruckt
mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.
Referent: Prof. Dr. Pohlisch.



Meiner lieben Frau.

Es ist das Verdienst von Recklinghausen's, daß er als erster in seiner grundlegenden Monographie 1882 mehrere bis dahin klinisch als verschieden betrachtete Krankheiten wie falsche Neurome, multiple Hautfibrome, Tumoren des Nervensystems usw. als einheitliches Krankheitsbild unter dem Namen Neurofibromatose zusammenschloß und durch histologische Untersuchungen ihre histogenetische Einheit bewies, indem er zeigte, daß alle diese Tumoren vom Nervenbindegewebe, dem Endo- und Perineurium, abstammen. Wie sehr dieses eigenartige Krankheitsbild seitdem das Interesse der Forscher in Anspruch nimmt, geht daraus hervor, daß Dermatologen, Pathologen, Chirurgen, Neurologen und in neuerer Zeit auch Erbbiologen durch zahlreiche Arbeiten bemüht gewesen sind, das Wesen dieser Krankheit aufzuklären. Durchsieht man nun die inzwischen sehr umfangreich gewordene Literatur über die Neurofibromatosis Recklinghausen, so fallen einem die häufig entgegengesetzten Ansichten anerkannter Autoren auf über die verschiedenen Gebiete dieses durch seine geradezu regellosen und oft widersprechenden Erscheinungsformen komplizierten Krankheitsbildes. Es ist somit sehr schwer, sich ein Gesamtbild dieser eigenartigen Erkrankung zu machen, da die Lehrbücher der Hautkrankheiten nur im wesentlichen die Anomalien an der Haut berücksichtigen, während die Neurologen die Befunde am Nervensystem in den Vordergrund stellen. Die Pathologen klären uns schließlich auf über die Veränderungen an den inneren Organen, die häufig erst bei der Autopsie gefunden werden. Wenn aber zwei Vertreter medizinischer Spezialfächer den gleichen Gegenstand behandeln, so wird ihre Darstellung und Auffassung entsprechend ihrer oft verschiedenen Einstellung in manchen Punkten abweichen.

Die Anschauungen über die Recklinghausensche Krankheit in Beziehung auf ihre Entstehung, Ursache und Erbllichkeit haben seit den umfassenden Arbeiten von Adrian aus den Jahren 1901 und

1903 starke Wandlungen durchgemacht, ohne daß man auch nur auf einem dieser Gebiete zu einer einheitlichen Auffassung gekommen ist. Feindel hat schon 1896 die Hypothese aufgestellt, daß es sich bei der Recklinghausenschen Krankheit um eine Entwicklungsstörung handelt, die das gemeinsame Keimblatt für Haut- und Nervensystem, das Ektoderm, vor seiner Differenzierung getroffen hat, eine Theorie, die heute allgemein angenommen wird. Nach H. Fischer fassen wir die Recklinghausensche Krankheit auf „als eine Summe von Symptomen, die ihren Grund haben in einer frühzeitigen Entwicklungsstörung hauptsächlich ektodermaler Anteile. Wir dürfen und müssen mithin gelegentlich bei der Recklinghausenschen Krankheit Entwicklungsstörungen an allen Geweben und Organen erwarten, die aus dem primitiven Ektoderm hervorgehen“.

Kaschiwara hält den Morbus Recklinghausen für eine Mißbildung, „die an jedem Punkte der Kette des cerebrospinalen, peripherischen, sympathischen und chrombraunen Systems ihren Ausgang nehmen kann“.

Stalman faßt die Neurofibromatosis als eine in ihrer Entstehung bis in die embryonale Entwicklungsperiode zurückgreifende blastomatoöse Erkrankung des Nervensystems auf, wobei krankhafte Reize auf dem Umwege über das Nervensystem allen Organen zugeleitet werden können, die dann funktionelle Störungen oder sogar anatomische Veränderungen erfahren.

Das häufige Nebeneinanderbestehen von kongenitalen Anomalien der Haut und des Nervensystems und das familiäre erbliche Auftreten dieser Erscheinungen haben Meirowsky veranlaßt, die Einwirkung auf das gemeinsame Keimblatt noch weiter zurückzuverlegen, in das Keimplasma, und zwar sieht er die Ursache in „einer Störung aller derjenigen Erbeinheiten, die sich am Aufbau des Ektoderms beteiligen und deshalb korrelationsgemäß auch alle Organe treffen kann, die dem gleichen Keimblatt entsprechen“.

Die bisher angeführten Autoren sehen, wie noch viele andere, die Ursache der Recklinghausenschen Krankheit in einer

keimplasmatifchen Störung des Ektoderms. Bei einer Reihe von Beobachtungen der Recklinghausenschen Krankheit reicht aber diese Erklärung nicht aus, sondern es finden sich häufig Störungen an Organen mesodermaler Herkunft, so daß man ohne die Annahme auch einer Störung des mittleren Keimblattes nicht auskommt. Curtius hat darauf hingewiesen, daß die Wucherung der Gefäßendothelien, besonders in den bläulichen Tumoren, dann die Bildung von Sarkomen aus den Tumoren für eine starke Beteiligung auch des Mesoderms sprechen.

Verocay, Herxheimer und Roth, Ehrmann, Meiwosky, um nur einige wenige Autoren zu nennen, nehmen ebenfalls in manchen Fällen eine Störung im Mesoderm an. Nicht einheitlich ist aber noch die Auffassung in der Frage, ob das Mesoderm primär miterkrankt, die Störung also auch in Erbheiten für das Mesoderm liegt, oder ob das mittlere Keimblatt sekundär erkrankt, dadurch daß Anomalien des Ektoderms auch Störungen der angrenzenden Teile des Mesoderms nach sich ziehen (Verocay).

Neben den Störungen des Keimplasmas für das Ektoderm sind in manchen Fällen auch solche für das Mesoderm vorhanden, denn es sind Anomalien an Organen und Organsystemen mesodermaler Herkunft, besonders am Knochenystem, beschrieben, die man nur mit dieser Annahme erklären kann.

Schließlich sind auch Neubildungen und Anomalien innerer Organe, also entodermalen Gewebes, bei der Recklinghausenschen Krankheit beobachtet worden. So beschreibt Adrian ein Carcinoma ventriculi, Siemens ein Cardiacarcinom, Kyrieleis ein Carcinom des Ductus cysticus. Saalman berichtet über einen Fall mit Hypernephrombildung, Korn über Dünndarmcarcinom. Alle diese Veränderungen sind bei der Recklinghausenschen Krankheit nicht als zufällige Komplikationen zu werten, sondern sie haben ihre gemeinsame Grundlage in einer Minderwertigkeit von Abkömmlingen des mittleren Keimblattes. Ribbert hat schon darauf hingewiesen, daß Bindegewebsschwäche die maligne Entartung epithelialer Elemente begünstigt. So ist es er-

klärlich, daß bei der Recklinghausenschen Erkrankung neben Störungen im Ektoderm und Mesenchym auch solche im Entoderm angetroffen werden, und es ist wohl anzunehmen, daß bei einer so schweren Störung des Keimplasmas für das Ektoderm auch die Minderwertigkeit der Gewebe der beiden anderen Keimblätter durch eine Störung im Keimplasma für diese bedingt ist.

Ball weist nachdrücklich darauf hin, daß die Recklinghausensche Krankheit auf dem Boden einer allgemeinen degenerativen Anlage entsteht. „Bei dieser Anlage beobachten wir entwicklungsgeschichtliche Anomalien, und ein Ausdruck einer solchen sind unter vielen anderen Mißbildungen auch die Symptome, die wir als die Kardinalsymptome der Recklinghausenschen Krankheit zu bezeichnen pflegen.“

Wir sehen also, daß die Recklinghausensche Krankheit kein geschlossenes Krankheitsbild ist, sondern die Folge einer keimplasmatischen Störung, deren qualitative und quantitative Auswirkung sehr verschieden sein kann. Ball und Fischer schlagen daher die Bezeichnung „Recklinghausenscher Symptomenkomplex“ statt Recklinghausensche Krankheit vor.

Ohne die Annahme einer krankhaften Keimanlage ist es nicht möglich, sich ein einigermaßen verständliches und zusammenfassendes Bild von den oft so sehr verschiedenen Erscheinungsformen der Recklinghausenschen Krankheit zu machen, und nur so kann man sich die verwirrende Fülle von Organveränderungen und funktionellen Störungen, die als Begleiterscheinungen dieser Krankheit auftreten, erklären.

Unter dem Gesichtspunkt der gemeinsamen Anomalie des Keimplasmas verstehen wir aber nicht nur die typischen, voll ausgebildeten Formen der Recklinghausenschen Krankheit mit ihren vier Kardinalsymptomen oder Symptomen erster Ordnung: Nerventumoren, Hauttumoren, großfleckige und kleinfleckige Pigmentierungen, sondern wir gewinnen auch Verständnis für die fakultativen oder Symptome zweiter Ordnung und die unvollständigen Formen dieser Krankheit, die einmal als Abortivformen oder Formes frustes, ein andermal als Jugend- oder Frühformen

beschrieben sind, wie sie von Adrian, Feindel, Oppenheim, Thibierge, Siemens, Fischer u. a. angegeben sind.

Die Meinung darüber, wieviele und welche von den klassischen Symptomen der Recklinghausenschen Krankheit fehlen können und man doch noch eine Abortivform annehmen kann, gehen auseinander. Am weitesten ist in dieser Beziehung Thibierge gegangen, der bei einem Falle ohne Hautfibrome und Nerventumoren lediglich auf Grund der Hautpigmentation und psychischer Störungen die Diagnose auf Recklinghausensche Erkrankung stellt, und Fischer sagt sogar: „Ich möchte auf Grund meiner Erfahrungen so weit gehen, jeden Fall mit typischen Café-au-lait-Flecken, auch wenn es nur einer ist, als äußerst verdächtig auf Recklinghausensche Krankheit anzusehen und bei Vorhandensein eines solchen Symptoms stets an die Möglichkeit des Vorliegens eines Recklinghausen denken.“ Siemens nimmt schon bei dem Vorhandensein von nur kleinen Recklinghausenschen Flecken mit typischer Lokalisation eine Abortivform an. Besonders Jost hat sich mit der Abgrenzung der unausgebildeten Formen von der typischen Recklinghausenschen Krankheit beschäftigt und in seiner Arbeit zusammengestellt, wieviele von den klassischen Symptomen fehlen können und doch die Diagnose Recklinghausensche Krankheit gestellt werden kann.

Bei diesen mangelhaft ausgebildeten Formen können die typischen Symptome sehr zurücktreten, und die nicht ständigen Anomalien, die Symptome zweiter Ordnung, das Krankheitsbild so beherrschen, daß durch sie erst auf eine Recklinghausensche Erkrankung hingewiesen wird. Die Bewertung dieser Symptome zweiter Ordnung hat Fischer eingehend studiert. Er rät auf Grund seiner Untersuchungen, den Begriff der Recklinghausenschen Krankheit sehr weit zu fassen und sich von dem Begriff der Hautaffektion möglichst weit zu entfernen, da das Wesen dieser Krankheit eben in dem Vorhandensein einer Störung des Keimplasmas liegt. Der Grad dieser Störungen bedinge das klinische Bild und die Art der späteren Veränderungen, die einmal das

Bild sogenannter typischer Fälle, ein andermal das Bild der Abortivfälle in den verschiedensten Ausdehnungen biete.

Gerade aber die letzteren sind ebenso wie die häufigen Begleitererscheinungen oder Symptome zweiter Ordnung sowohl in ihrer klinischen Bedeutung als auch für die Frage der Vererbung von außerordentlicher Wichtigkeit und verlangen daher unsere besondere Aufmerksamkeit.

Mit ihrer Berücksichtigung wachsen aber auch zugleich die Schwierigkeiten in der Abgrenzung sowohl gegen die Recklinghausensche Krankheit selbst, da voll ausgeprägte Fälle seltener zur Beobachtung kommen als die Abortivfälle, als auch der Recklinghausenschen Krankheit gegen andere Entwicklungsstörungen, die ebenfalls diese Symptome aufweisen können und in sehr engen genetischen Beziehungen zu ihr stehen. Bielschowsky hat hierfür den Begriff der fötalen Spongioblastosen geprägt. Zu ihnen gehören außer der Recklinghausenschen Krankheit noch die tuberöse Sklerose, die familiäre hypertrophische Neuritis und die Gliose, bei denen es sich um dysgenetische Störungen in der Spongioblastenwanderung und ihrer Entwicklung handelt.

Sommer faßt diese Dysgenesen als verschiedene Äußerungen einer gleichartigen Entwicklungsstörung auf. Orzechowski und Nowicki halten die Recklinghausensche Krankheit und die tuberöse Sklerose für zwei Varianten ein und desselben Krankheitsprozesses. Riehl, Nobel, Hintz haben auf das auffallende Parallellaufen beider Erkrankungen in Bezug auf Pigmentanomalien, fibröse Tumoren, Mißbildungen, Intelligenzstörungen und Heredität hingewiesen. Ferner stützt die Beobachtung von Mischformen zwischen beiden Störungen bei demselben Individuum die Auffassung von der nahen Verwandtschaft zwischen tuberöser Sklerose und Recklinghausenscher Krankheit.

Bielschowsky hat durch seine Untersuchungen gezeigt, daß es sich bei der hypertrophischen Neuritis um nichts anderes handelt als eine eigenartige Form der Recklinghausenschen Krankheit.

Bender und Panse sprechen vom „Erbkreis“ der fötalen Spongioblastosen, zu dem sie neben der tuberösen Sklerose, der Recklinghausenschen Krankheit und der familiären hypertrophischen Neuritis gewisse Gliome, nämlich die ventrikelnahen Spongioblastome rechnen, und weisen darauf hin, daß dieser mit den genannten Erkrankungen sicherlich noch nicht abgeschlossen ist. So gehören wahrscheinlich hierher noch folgende, nach heutiger Auffassung gleichfalls auf dem Boden fehlerhafter Anlage beruhende Hautkrankheiten, namentlich (nach Fischer) die systematisierten verrucösen Naevi, ausgedehnte Tierfellnaevi, die Epidermolytis bullosa hereditaria, Formen schwerer Ichthyosis, die Darier'sche Dermatose, die Cutis und Pseudocutis verticis gyrata.

Fast alle Autoren, die sich mit diesem Fragenkomplex beschäftigt haben, stimmen darin überein, daß die äußeren Verschiedenheiten innerhalb dieser fötalen Spongioblastosen bedingt werden durch den Zeitpunkt, an welchem in der fötalen Entwicklung die Störung einsetzt, da sie ihre Entstehung dysgenetischen Vorgängen bei der Migration und Verteilung der Neuroblasten und Spongioblasten von der Matrix (Ventrikelumgebung) zur Peripherie (Rinde) verdanken.

Die Anordnung der grauen und weißen Substanz wird nach H. Vogt im allgemeinen zwischen dem vierten und sechsten Embryonalmonat erreicht. Vorher einsetzende Störungen haben daher grobe Mißbildungen zur Folge, zu denen wahrscheinlich auch die Gangliogliome zu rechnen sind.

Der Zeitpunkt der zur tuberösen Sklerose führenden dysgenetischen Einwirkung ist in die Zeit zu verlegen nach Vollendung der groben Zyto- und Myeloarchitektonik, kurz nachdem die Rindenschichtung fast oder gar vollständig ausgebildet ist, also kurz nach dem 4. bis 6. Monat.

Noch später wären, wie Bender und Panse angeben, die Entwicklungsstörungen bei der zentralen Form der Recklinghausenschen Krankheit anzusetzen, da hier die Neuroblastenwände

rung von der Matrix aus bereits völlig abgeschlossen ist und die sich bei ihr findenden Spongioblastenherdchen und Zellschwärme, die ihre Entstehung einer Störung der Spongioblastenwanderung und -entwicklung verdanken, besonders gehäuft in der Nähe der Ventrikelwand anzutreffen sind. Die Ganglienzellen bieten hier keine dystopischen Abweichungen mehr, es finden sich vielmehr nur Störungen der Spongioblastenwanderung, die nach Bieleschowskys Meinung mit der Neuroblastenwanderung nicht ganz parallel läuft, sondern im ganzen in einer etwas späteren Föetalperiode vor sich geht. Am spätesten wäre die Entwicklungsstörung bei der reinen peripheren Form der Recklinghausenschen Krankheit und der hypertrophischen Neuritis, die erst dann einsetzt, nachdem die Hirnentwicklung abgeschlossen ist.

Für die Frage der Genese der Recklinghausenschen Krankheit sind bis in neuester Zeit immer wieder von einzelnen Beobachtern exogene Faktoren wie Infektionskrankheiten, unter denen die Lues eine besondere Rolle spielt, Traumen, Intoxikationen usw. angegeben worden, doch ist heute wohl allgemein anerkannt, daß durch diese äußeren Einflüsse nur die bis dahin auf fehlerhafter Keimanlage beruhende, latent gebliebene Anomalie manifest wird. Ebenso wie die exogenen wirken die endogenen Einflüsse, unter denen Pubertät, Gravidität und Klimakterium häufig als auslösende Faktoren genannt werden.

Der erbliche Charakter der Recklinghausenschen Krankheit wird kaum noch angezweifelt und ist durch eine Reihe von Untersuchungen einwandfrei bewiesen. Schon 1902 und 1903 stellten Adrian und Petré n fest, daß die Krankheit in einem Fünftel der Fälle familiär auftritt. Herxheimer und Roth berichteten 1913 von 67 Fällen erblicher Neurofibromatose. Hoekstra hat 1922 eine Zusammenstellung über die Erbverhältnisse nach der Literatur gegeben. In einigen Fällen bei seinen 77 Stammbäumen mit familiärer Erkrankung konnte er das Auftreten bis zu vier Generationen nachweisen. Er stellt auch fest, daß in der Regel die degenerativen Erscheinungen sich in der Descendenz massiver entwickeln. Andererseits liegen aber Beobachtungen vor,

daß die Erscheinungen in der Descendenz immer abortiver werden, und schließlich sehen wir völlige Regellosigkeit.

Lange, Hoekstra, Preiser und Davenport, Aschner halten die Recklinghausensche Krankheit für ein im wesentlichen dominant erbliches Leiden. Zu einer ganz anderen Anschauung gelangt dagegen Siemens, der an 20 eigenen Fällen den Erbgang studiert hat. Er konnte nur in den seltensten Fällen eine klare Dominanz des Erbanges feststellen, während bei den meisten die Dominanz durchaus nicht mit Sicherheit nachzuweisen war. Siemens erklärt sich dieses wechselnde Verhalten in der Erscheinungsform und im Erbgang nach der Annahme von Preiser und Davenport durch das Vorhandensein verschiedener Erbstämmen (Biotypen) in den einzelnen Familien, die im Erbgang und im klinischen Bilde Besonderheiten zeigen können, oder aber es bestehe auch die Möglichkeit, daß sich die familiären Besonderheiten durch andere Erbanlagen erklären, die zufällig neben der Recklinghausenanlage zugegen sind. Er kommt zu der Annahme einer zum mindesten sehr unregelmäßigen Dominanz bei der Recklinghausenschen Krankheit und erhärtet diese Annahme noch durch den Hinweis auf die außerordentlich geringe Fruchtbarkeit der Recklinghausen-Kranken, wodurch das Leiden bei einfach dominantem Erbgang einer negativen Auslese unterliege und sein Verschwinden sich deshalb tatsächlich absehen lassen müßte. Ferner weist er noch darauf hin, daß die Krankheit häufiger durch äußerlich Gefunde als durch Kranke übertragen wird, was auch das sporadische Vorkommen der Neurofibromatose erklärt. Wir müssen hierbei annehmen, daß Personen der Vorfahrenreihe latente Träger der Krankheitsanlage sind. G. A. Fischer hat dann, angeregt durch die Untersuchungen von Siemens, das Literaturmaterial daraufhin durchgesehen, ob eine Fruchtbarkeitsminderung bei Recklinghausen-Kranken allgemein vorhanden ist, und hat an Hand von 466 Literaturfällen die Resultate von Siemens im wesentlichen bestätigen können.

Klare dominante und unklare dominante Erbgänge beherrschen heute das Bild. Zur Klärung des Charakterbildes der Reck-

linghausen-Kranken benutzte Blot evogel bei ihren Untersuchungen außer der Genealogie noch anderes genisches Material, um dadurch der Klärung der „neurofibromatösen Konstitution“ näherzukommen. Sie suchte leicht zugängliche somatische Merkmale zu erfassen, die den an Neurofibromatose Erkrankten von anderen Kranken und Gefunden unterscheiden, und benutzte Untersuchungen der Blutgruppen, das Daktylogramm und anthropologisch meßbare Abweichungen. Blot evogel glaubt auf diese Weise verwertbare Resultate gefunden zu haben, die einer weiteren Nachprüfung wert sind und einen neuen gangbaren Weg weisen.

Bei der vielseitigen Änderung der Manifestation der Recklinghausen'schen Krankheit ist für die Frage der Vererbung nicht der Grad der Anlagestörung und nicht der Grad der Erscheinungsform von Bedeutung, sondern wichtig ist die Frage, ob bei dem einzelnen Individuum überhaupt Anzeichen vorhanden sind, die für eine Störung des Keimplasmas sprechen, wie sie bei der Recklinghausen'schen Krankheit anzunehmen ist. Wenn Fischer für die Diagnose der Neurofibromatose rät, den Begriff der Recklinghausen'schen Krankheit sehr weit zu fassen und sich von dem Begriff der Hautaffektionen möglichst weit zu entfernen, so gilt das in gleichem Maße für die Frage der Vererbung. Faßt man aber den Begriff nicht so weit und läßt die atypischen und monosymptomatischen Fälle, die von nicht geübten Untersuchern häufig als solche nicht erkannt und übersehen werden, außer acht, so wird man oft scheinbar negative Ergebnisse dort erhalten, wo in Wirklichkeit positive vorliegen. Es gewinnen somit die fakultativen Symptome in einer Recklinghausen-Kranken-Sippe für die Vererbung größere Bedeutung. Curtius hat in seinen vorbildlichen Familienuntersuchungen über die Multiple Sklerose schon darauf hingewiesen, daß die erbbiologische Betrachtungsweise sehr wesentlich dazu beitrug, den Blick von den „klassischen“ voll ausgeprägten Krankheitsformen abzulenken auf die Mikroformen, die Rudimentär- und Abortivfälle.

Die erbbiologische Untersuchung einer Sippe führt daher nur

zu einem verwertbaren Ergebnis, wenn man jedes einzelne bei den einzelnen Individuen vorkommende Symptom berücksichtigt und darauf prüft, ob seine Genese auf einer Störung des Keimplasmas beruht. Gehört eine Person mit einer solchen Störung einer Recklinghausen-Krankenfamilie an, so kann man die Diagnose auf viel weniger Anzeichen aufbauen als bei jemandem, der nicht einer solchen Familie angehört, denn in diesem Falle stempelt auch ein Einzelsymptom den Träger schon als behaftet.

Es ist ferner zu beachten, daß die verschiedenen Symptome bei der Recklinghausenschen Erkrankung häufig erst im Laufe der Entwicklung oder gar erst im ausgereiften Alter auftreten können, so daß es oft kaum festzustellen ist, ob es sich in dem vorliegenden Fall um eine inkomplette Form, Forme fruste, oder um einen Fall handelt, bei dem die Symptome erster Ordnung erst später manifest werden. Es gilt das natürlich besonders für Kinder und jüngere Erwachsene.

Um die Bewertung solcher weniger belasteten Familienmitglieder für die Frage der Vererbung richtig beurteilen zu können, würde man sicher sehr viel weiter kommen, wenn man sich nicht mit der einmaligen Untersuchung einer mit dieser krankhaften Keimanomalie behafteten Familie begnügte, sondern fortlaufend oder wenigstens nach einer Reihe von Jahren die Untersuchungen wiederholen und die weitere Entwicklung der ganzen Sippe, besonders die bei den Jugendlichen erhobenen Befunde verfolgen würde.

Auf diese Weise würde erst ein brauchbares Material beschafft, um die von Siemens angenommenen einzelnen verschiedenen Erbstämme oder den Einfluß anderer Erbanlagen bei der Manifestation der Recklinghausenschen Krankheit besser kennen zu lernen, und an dem die Erbforschung der in ihrer Erscheinungsform und Vererbung so komplizierten Erkrankung mit größerer Aussicht auf Erfolg betrieben werden könnte, zumal die Materialbeschaffung heute in den erbbiologischen Forschungsinstituten organisiert ist. Aus dem Mangel an geeignetem Material für die Untersuchung erklärt sich sicher auch ein großer Teil der sich wider-

sprechenden Ansichten vieler Autoren über die Erbllichkeit der Recklinghaufenschen Krankheit, da sie zwar viele Kranke zu erfassen suchten, sich aber meist mit der Untersuchung einiger weniger Verwandten begnügen und im übrigen auf anamnestische Angaben verlassen mußten. So hat Mosbacher für seine interessante Arbeit über acht Familien sicher Behafteter in zwei Familien nur je einen, in vier Familien nur je zwei, in einer Familie drei und schließlich in einer Familie vierzehn Angehörige, also in acht Familien zusammen nur dreißig Angehörige untersuchen können.

Durch den Erlaß und die Durchführung der Erbgesundheitsgesetze hat das Volk ganz allgemein mehr Interesse und Verständnis für erbbiologische Fragen bekommen. Man wird daher in Zukunft nicht mehr so sehr wie bisher mit den Untersuchungen auf Widerstand stoßen. Uns ist nicht nur von keiner Seite auch nur die geringste Schwierigkeit gemacht worden, sondern wir haben überall großes Entgegenkommen gefunden.

Im Gegensatz zu Siemens, der ausdrücklich erwähnt, daß die von ihm erhobenen anamnestischen Angaben bei der später erfolgten Untersuchung sich alle als richtig erwiesen, haben wir bei unseren Untersuchungen gerade die entgegengesetzte Beobachtung gemacht. Jeden einzelnen haben wir vor der Untersuchung gefragt, ob er Veränderungen an der Haut wie Flecken, Warzen oder Geschwülstchen habe, und von allen wurde das abgelehnt, auch von dem intelligenten Vater des Probanden. Nach unserer Erfahrung ist demnach jede anamnestische Angabe in dieser Beziehung nicht verwertbar, denn berücksichtigt man auch nur die positiven Angaben, so verfällt man in den Fehler der positiven Auslese und erhält dadurch ebenfalls ein falsches Ergebnis.

Im folgenden bringen wir nun die Ergebnisse der psychiatrisch-neurologischen und dermatologischen Untersuchung einer Sippe, in der sich ein Recklinghausen-Kranker mit angeborenem Schwachsinn befindet. Außerdem wurden folgende anthropologische Messungen am Kopf: Schädelbreite, Schädellänge, Stirnbreite und Schädelumfang vorgenommen, die jedoch zu keinem verwertbaren Ergebnis


fürten, da bei den Verwandten keine Abweichungen von der Norm gefunden wurden.

Anlaß zu dieser Arbeit gab uns ein Fall von Recklinghausen-cher Krankheit kombiniert mit Schwachinn, der zur Erstattung eines Gutachtens zwecks Sterilisierung des Kranken dem Rheinischen Provinzial-Institut für psychiatrisch-neurologische Erbfor- schung in Bonn überwiesen worden war.

Zu diesem Zwecke wurden alle lebenden näheren Blutsver- wandten des Probanden ärztlich untersucht, und zwar war uns dies in einem Umfange möglich, wie das bisher in der Literatur noch nicht zu finden ist. Von den lebenden 32 in Frage kommenden Verwandten konnten, wie nachfolgende Sippentafel zeigt, 31 Blutsverwandte des Probanden untersucht werden.

Es wurden ferner untersucht der Stiefvater der Mutter und der Stiefvater des Vaters. Bei letzterem wurde ein für unsere Unter- suchung bedeutungsvoller Befund erhoben, auf den wir noch später zu sprechen kommen werden.

Sippentafel.



Die Familien beider Eltern des Probanden sind in den 90er Jahren von Ostpreußen nach Westfalen verzogen und haben mit ihren Verwandten in Ostpreußen keine Verbindung mehr, so daß noch weitere Untersuchungen und Erhebungen nicht mehr möglich waren.

Es ist zunächst darauf hinzuweisen, daß beide Eltern des Probanden uneheliche Kinder waren und daß die untersuchten Geschwister der Eltern alle nur Halbgeschwister sind. Die Großmütter des Probanden sind beide (2)¹⁾ (6) tot, und anamnestisch konnte bei beiden nichts in Erfahrung gebracht werden, was auf eine Recklinghausensche Erkrankung oder auf eine Abortivform hindeutete, da von irgendwelchen Veränderungen an der Haut oder sonstigen Anomalien nichts bekannt war. Ganz besonders wurden diese auch bei der Mutter des Vaters (2) von deren Tochter abgelehnt, die sie bis zu ihrem vor einigen Jahren erfolgten Tode gepflegt hatte.

Über den Großvater mütterlicherseits konnten wir nichts erfahren. Von dem Vater des Vaters (1) hieß es, daß er landwirtschaftlicher Arbeiter, ein schmucker Kerl und tüchtiger Arbeiter war. Die Heirat mit der Großmutter (2) habe sich zer schlagen und er sei nach Berlin gezogen. Seitdem habe man nichts mehr von ihm gehört.

Krankengeschichte des Probanden (39):

1. Eigene Angaben: Die Angaben des Probanden über seine Familie waren nicht sicher verwertbar. Er machte über seine eigene Vorgeschichte folgende Angaben: Er sei in H. als zweites von sechs Kindern geboren worden. Als kleines Kind habe er die englische Krankheit gehabt und erst mit sechs Jahren habe er laufen gelernt. Bei den ersten Gehversuchen sei er oft schwer gestürzt, und zwar sei er immer gerade auf den Kopf gefallen. Davon habe er sehr große Narben und Beulen an der Stirn zurückbehalten, die allerdings im Laufe der Jahre kleiner geworden seien. Bei diesen Stür-

1) Die in Klammern stehenden Zahlen beziehen sich auf die Zahlen in der Sipptafel.

zen habe er nicht das Bewußtsein verloren, auch keine Krampfanfälle erlitten.

Erst mit neun Jahren sei er eingeschult worden. Er sei in die Volksschule gegangen und nicht sitzen geblieben, die Lehrer seien mit ihm zufrieden gewesen. (Vgl. dazu die Angaben des Vater.) Im ganzen habe er allerdings nur sechs Jahre lang die Schule besucht, da er so spät eingeschult worden sei.

Nach der Schulentlassung 1925 habe er keine regelrechte Arbeit gehabt, sondern der Mutter im Haushalt geholfen.

Etwa 1928 habe er sich den rechten Oberschenkel gebrochen, als er beim Spielen vom Speicher eines benachbarten Bauernhauses gefallen sei. Das Haus sei wohl 10 m hoch gewesen. Er habe nach dem Sturze das Bewußtsein nicht verloren und kein Erbrechen gehabt. Er sei nur so erstaunt gewesen, daß er nicht habe laufen können, da das rechte Bein immer so hin und her schlenkerte und daß die anderen alle noch oben gestanden hätten. Er habe neun Wochen im Städtischen Krankenhaus in H. gelegen und sei dann als geheilt entlassen worden. 1929 sei seine Mutter an Schwindfucht gestorben. Von 1931 bis 1933 habe er eine Stellung als Ausläufer im Blindenheim gefunden. Er habe die durch Vertreter verkauften Bürsten und Besen zu den betreffenden Kunden hingebracht.

Seit 1933 habe er dann als Straßenhändler Bürsten, Aufnehmer und Kurzwaren verkauft. Er verdiene dabei ein wenig, müsse jedoch weiter vom Vater unterstützt werden und wohne auch noch bei ihm zu Hause.

Er habe zwar Freunde, gehe aber fast immer für sich allein. Für Mädchen habe er kein besonderes Interesse. Er wisse ja, daß das nichts für ihn sei, da er doch nicht heiraten und eine Frau ernähren könne.

Ernstliche Erkrankungen habe er außer dem Oberschenkelbruch nicht durchgemacht.

II. Angaben des Vaters: Er sei bei der Geburt des Probanden mit anwesend gewesen. Es sei aber dabei nichts Auffälliges vorgekommen. 14 Tage nach der Geburt sei der Junge kränklich gewor-

den und habe Zuckungen und krampfartige Erscheinungen gehabt, so daß man befürchtet habe, er werde dabei ersticken. Die Krämpfe habe er nur im ersten und zweiten Lebensjahr gehabt. Die „Drüsen in der Haut“ (vgl. Befund) seien von Geburt an dagewesen. Der Arzt habe von „Gehirnkrankheit“ und englischer Krankheit gesprochen.

Bis zum sechsten Lebensjahr sei der Proband Bettnäßer gewesen. Laufen habe er erst mit 5—6 Jahren gelernt und sei dabei so unbeholfen gewesen, daß er dauernd hinfiel. Er sei stets wie ein „platter Sack“ hingeschlagen, ohne den Sturz mit den Händen aufzufangen. Davon und von einem Fall von einer etwa 1 m hohen Mauer rührten die großen Narben an seiner Stirn her.

Sprechen habe der Proband mit zwei bis drei Jahren gelernt, freilich habe er nicht so deutlich wie die anderen Kinder gesprochen.

Als er mit neun Jahren eingeschult wurde, habe er zunächst die Hilfsschule besuchen sollen, wegen des sehr weiten Schulweges habe man aber gestattet, daß er die nahe gelegene Volksschule besuchte. Wie oft der Proband sitzen geblieben sei, wisse er nicht. Er sei wohl der Form halber ein- oder zweimal mitgestiegen. Er sei eben mitgeschleppt worden, um die einfachsten Kenntnisse zu erlangen.

Seit 1933 sei er als Straßenhändler tätig. Er verdiene zwar wöchentlich nur etwa 5 RM, habe aber doch wenigstens eine regelmäßige Beschäftigung.

III. Befund des Probanden:

Alter: geb. 18. 1. 1910. Größe: 1,53 m. Gewicht: 54 kg. Guter Allgemeinzustand, reichlicher Fettansatz am Bauch. Keine Ödeme. Kurze untere Gliedmaßen, während der Oberkörper und die Arme verhältnismäßig lang sind. Hände und Füße auffallend plump, kurz und gedrungen.

Kopf: eckig, quadratisch. Der Hirnschädel übertreffe an Umfang den Gesichtsschädel. Schädelumfang: 59,2 cm. Beiderseits auf der Stirn erhebliche, unregelmäßige Narben! Links 5 cm mal 1,2

cm. Rechts zwei parallele Narben: a) 4,5 cm mal 1,0 cm, darüber b) 3,0 mal 0,5 cm. In der Stirnmitte zwei kleinere, lineare Narben.

An der Haut des Rumpfes, ganz gering auch der Extremitäten, zahllose, kleinste bis nußgroße Geschwülste; ganz weich, z. T. im Niveau der Haut oder darunter, z. T. auch gestielt, z. B. am Rücken, mehrere ganz kleine Fibromata pendula. Am linken Schienbein unter der Haut ein größerer Knoten. Besonders große Fibrome beiderseits in den Gefäßfalten.

In der Mitte des Kreuzes über der Gefäßfurche ein großer Pigmentfleck (Café-au-lait-Fleck): 6,0 mal 4,0 cm. An der rechten Gefäßachse ein ebenfolcher: 7,0 mal 2,0 cm. Außerdem mehrere mittelgroße und ferner sehr zahlreiche ganz kleine Pigmentflecke an Brust, Bauch und Rücken, ganz selten an den Extremitäten.

Mundhöhle: hochgradige Parodontose. Gebiß nicht gepflegt, Zähne zum Teil hochgradig kariös; der seitliche Schneidezahn ist auf der rechten Seite in Ober- und Unterkiefer schief gestellt, alle vier Weisheitszähne und der zweite Molar unten rechts sind nicht angelegt, bzw. nicht vorhanden. Zunge feucht, belegt, ohne Bißnarben. Rachen o. B.

Schilddrüse nicht vergrößert, keine Drüsenanschwellungen. Das Herz ist nach rechts verlagert. Das Röntgenbild zeigt außerordentlichen Hochstand des linken Zwerchfells, starke Luftblähung unter dem Zwerchfell. Die Durchleuchtung: ungeheure Luftblähung des Magens. Beim Schlucken von Brei läßt sich sehr gut verfolgen, wie der Patient große Mengen von Luft mitchluckt. Sonst sind die inneren Organe o. B.

Urin: Alb. Ø; Sach. Ø; Blut: Wa-R —; Liquoruntersuchung: o. B.

Nervensystem: Kopf nicht klopf- oder druckempfindlich. Augen: Befund der Universitäts-Augenklinik Bonn: Alternieren des Schielen, vorwiegend rechts. In Primärstellung hat man den Eindruck von langsam ruckartigen Bewegungen; wir können uns jedoch nicht davon überzeugen, daß es sich dabei um einen Nyctagmus handelt. Augen äußerlich reizlos, rechts paracentral maculae corneae. Vifus rechts $4/50$, links $0,5$ (Kindertafel), der Nahvifus ist

bei dem Patienten nicht zu prüfen. Hornhautastigmatismus rechts $1,5/20^\circ$, links $1,0/180^\circ$. Objektiv rechts geringer myopischer Astigmatismus, links Emmetropie. Am Augenhintergrund fanden wir beiderseits die Papille temporal weißlich gefärbt, rechts mehr als links. Die genaue Entscheidung, ob es sich um eine temporale Abblaffung handelt, ist nur durch Gesichtsfeldprüfung usw. zu treffen, was aber bei dem Geisteszustand des Patienten unmöglich ist. Gefäße und Makula o. B. Lidspalten gleich weit. Pupillen gleich weit, mittel, kreisrund. Rasche, aber nicht sehr ausgiebige Licht- und Convergenzreaktion.

Hirnnerven: o. B. Auch Cochlearis und Vestibularis o. B. Reflexe: Radiusperioistreflex beiderseits ++; Tricepsreflex beiderseits ++; Bicepsreflex beiderseits +; Mayer'scher Grundgelenkreflex links nicht sicher auslösbar, rechts +; Trommer und Knipsreflex negativ. Finger-Nasen-Verfuch: etwas ungeschickt, aber ohne eigentliche Ataxie. Barany'scher Verfuch: kein Vorbeizeigen. Grundversuch: kein Abweichen oder Absinken der vorgestreckten Arme; Diadochokinese beiderseits einigermaßen geschickt ausgeführt. Bauchdecken- und Cremasterreflex + (rechts—links). Patellarreflex beiderseits leicht gesteigert, links lebhafter als rechts. Rabinski Ø; Rossolimo Ø; Mendel-Bechterew Ø; Gordon Ø; Oppenheim links Ø, rechts fraglich +; Achillessehnenreflex: beiderseits mehrere klonische Nachzuckungen, links = rechts. Keine Klone auslösbar. Romberg Ø. Knie-Hacken-Verfuch: ungeschickt, aber ohne eigentliche Ataxie. Tonus der Muskulatur normal, an den Beinen links wohl etwas vermehrt gegen rechts; keine Atrophie; grobe Kraft gut.

Sensibilität nicht gestört, doch auffallend unempfindlich gegen Schmerzen.

Gang: stumpfend, hebt die Füße kaum vom Boden ab, dabei unsymmetrische Haltung: Kopf leicht nach rechts auf die Schulter gelegt, rechter Arm wird schlendernd mitbewegt, während der linke meist ganz steif gehalten wird.

Die pathologisch-histologische Untersuchung eines exstirpierten Tumors aus der Bauchdecke durch das hiesige Pathologische Institut ergab: „Das Exzisionsstück besteht aus einem fibromartigen

Gewebe mit eingelagerten spindeligen und auch rundlichen Zellen. Eine typische Neurofibromatosis liegt nicht vor. Der Befund ist jedoch durchaus verdächtig“.

Röntgenbefunde: Schädel: ziemlich großer Gehirnschädel. Die Sella turcica zeigt eine etwas unregelmäßige Form, es besteht aber keine Erweiterung oder Vertiefung! Encephalographie: obwohl erhebliche Mengen Liquors lumbal entnommen und durch Luft ersetzt wurden (zuerst 90 ccm, dann nochmal 70 ccm), ließ sich das Ventrikelsystem nicht darstellen. Luftansammlungen in der Suboccipitalgegend sind bei Kontrollen nicht feststellbar. Es läßt sich nur eine deutliche, an einzelnen Stellen fleckige, rechts vielleicht etwas deutlicher als links angesprochene, Subarachnoidealfüllung erkennen.

Hände: eine ausgesprochene Mißbildung ist hier nicht feststellbar. Die Hand ist auffallend kurz.

Füße: auch hier sehr kurze Metatarsalia. Lateralflexion der Zehen, keine grobe Mißbildung.

Leichte Skoliose der Wirbelsäule nach rechts, leichte Linksverschiebung des Kehlkopfs.

Seelisches Verhalten: O. war während seines Aufenthaltes in der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt B. bewußtfeinsklar und über Ort und Zeit orientiert; keine Anhaltspunkte für das Bestehen von Sinnestäuschungen und Wahnideen; gutmütig, zutraulich und distanzlos. Aufforderungen kam er willig und unermüdlich nach. Bei den vorgenommenen diagnostischen Eingriffen zeigte er eine bemerkenswerte Gleichgültigkeit und Unempfindlichkeit gegen Schmerzen. Dem Leben auf der Krankenabteilung fügte er sich ohne Schwierigkeiten ein, jedoch blieb er bis zu einem gewissen Grade unselbständig. Seine gemüthlichen Regungen beziehen sich fast durchweg auf die Befriedigung der einfachsten körperlichen Bedürfnisse. Im Anstaltsgebäude fand er sich schwer zurecht. Die Intelligenzprüfung ergab einen mäßigen Grad von Schwachsinn (Debilität). Die Schrift ist ungeschickt und schlecht leserlich. Er macht zahlreiche Rechtschreibungsfehler und läßt Buchstaben und Silben aus. Der Inhalt des von ihm geschriebenen Lebenslaufs ist

außerordentlich primitiv. Beim Lesen macht er ebenfalls reichliche, z. T. sinnwidrige Fehler. Die Leistungen beim Rechnen waren verhältnismäßig besser, die Bildung von Oberbegriffen dürftig und primitiv.

Überblicken wir noch einmal kurz das Wesentliche des Falles O. Der Rumpf ist überfät von 58 kleinen Hautgeschwülsten. Die pathologisch-histologische Untersuchung einer dieser Geschwülste ergab ein fibromartiges Gewebe, das von dem untersuchenden Pathologen als durchaus verdächtig für Neurofibromatosis bezeichnet wird. Ferner finden sich an der Haut mehrere kleine bis nußgroße Fibromata pendula, einige große und zahlreiche kleine Café-au-lait-Flecke. Neben diesen vier Kardinalsymptomen der Recklinghausenschen Krankheit fanden sich noch zahlreiche stark pigmentierte Naevi, als Skelettanomalien auffallend kurze Hände und sehr kurze Metatarsalia, leichte Skoliose der Wirbelsäule, Deformität der Sella, großer Gehirnschädel, Fehlen der vier Weisheitszähne und eines Molaren, Schiefstellung der beiden seitlichen Schneidezähne rechts. Bei der Encephalographie war das Ventrikelsystem trotz Einführung sehr großer Mengen Luft nicht darstellbar. Neben den sonst gefundenen pathologischen Befunden an den Augen ist hervorzuheben, daß die Papille beiderseits temporal weißlich gefärbt ist, was für eine temporale Abbläsung verdächtig ist. Nachweisbare Reflexveränderungen fanden sich: Patellarreflex links gesteigert gegen rechts, Oppenheim rechts positiv. Die Untersuchung des Geisteszustandes ergab eine Debität mittleren Grades.

Sippchaftserhebungen: Folgende Blutsverwandte des O. wurden untersucht:

- A. Die 5 Geschwister des O. und eine 10 Tage alte Nichte.
- B. Der Vater des O.
- C. Die 4 Halbgeschwister des Vaters mit Kindern.
- D. Die 6 Halbgeschwister der verstorbenen Mutter mit deren Kindern.

Außerdem wurden der Stiefvater der Mutter und der Stiefvater des Vaters untersucht.

A. Geschwister des Probanden und eine Nichte.

1. Anna K., geb. O. (38), geb. am 25. 10. 1908. Schmale, blasse, freundliche junge Frau. Intellektuell gut begabt, unterhält sich frei und geschickt, gute Schulleistungen. Reflexe lebhaft, sonst neurologisch o. B., vereinzelter Pigmentnaevus am rechten Fußrücken, Haut sonst ganz frei. Kein Hohlfuß.

2. August O. (40), geb. 6. 3. 11. Schreiner, SA.-Mann, verheiratet, 1 Kind. Zugänglicher, energischer, geweckter Mensch. Ephe-
liden im Gesicht. Ein kleiner Naevus pigmentosus 2 Querfinger oberhalb des linken Rippenbogens. Im Nacken (linke Halsseite) kleiner erhabener Naevus. Kleinere Naevi ganz vereinzelt an den Armen und im Gesicht. Auf der linken Schulter 3 bis zu 1 cm im Durchmesser große, weißliche, weiche Geschwülste (Fibrome), Konsistenz ähnlich wie bei den Hautgeschwülsten des Probanden. Kein Hohlfuß. Neurologisch o. B.

3. Maria O. (41), geb. 7. 7. 12. Stenotypistin. Hübsches, frisches, gut gewachsenes Mädchen. Intellektuell offenbar gut begabt, sehr gute Zebgnisse. Unterhalb der linken Clavicula ein 3—4 mm großer, etwas erhabener Pigmentnaevus, mehrere nicht erhabene kleine Naevi an beiden Oberarmen. Sonst Haut o. B. Neurologisch: Reflexe sehr lebhaft, seitengleich, sonst o. B. Beiderseits deutlicher Hohlfuß, starker Eindruck des Schuhriemens beiderseits auf dem „hohen Spann“. Starke Hornhautschwielen an den Fuß-
sohlen im Bereich der Belastungszone, besonders an der Innenseite des Ballens und der Ferse. Sehr starke Schwielen an der Innenseite der linken Ferse. Schuhgröße 38.

4. Helene O. (42), geb. 5. 10. 15. Friseurin. Ebenfalls sehr ansehnliches, frisches Mädchen. Gut gewachsen. Will in Kürze einen SS.-Mann heiraten, macht sich Sorge wegen der vorgenommenen Untersuchung, ob die Ehe erlaubt wird. Daumen wie bei F. O. kurz und plump (Gleiche Daumen soll die verstorbene Mutter gehabt haben.) Im Gesicht 7 deutlich sicht- und tastbare, deutlich erhabene Pigmentnaevi. Ein kleiner Naevus unterhalb der rechten

Clavicula. Haut sonst o. B. Kein Hohlfuß. Außerordentlich lebhafte, seitengleiche Reflexe, sonst neurologisch o. B.

5. Josef O. (43), geb. 5. 1. 22. Besuchte die kaufmännische Schule. Geweckt, zugänglich, bescheiden. Im Gesicht zahlreiche Epheliden. Ein erhabener bräunlicher Naevus links von der Wirbelfäule in Höhe etwa des 10.—11. Brustwirbels. Neurologisch o. B.

6. Das 10 Tage alte Kind (55) von August O. (40) hatte einen leichten Ikterus neonatorum. Haut ganz glatt.

B. Vater des Probanden.

7. Andreas O. (11), geb. 1884. Sehr intelligent, zweifellos überdurchschnittlich begabt bei Berücksichtigung seiner Bildungsstufe. War lange Jahre Zentrumsstadtverordneter und Abteilungsleiter bei der Arbeitsvermittlung. Besitzt ein selbstgebautes Haus, äußerst sauber und wohnlich, Garten vorzüglich gehalten. Seit einem halben Jahre wieder verheiratet. Die Frau macht einen netten, soliden, einfachen Eindruck. Er gibt bereitwillig Auskunft und zeigt zahlreiche Familienbilder. Haare steil aufrecht gebürstet. Schwer kriegsbeschädigt. Am Hals und Nacken mehrere, am Bauch und Rücken vereinzelte ganz kleine Fibromata pendula. Ferner einzelne kleine Naevi vasculosi. Eine Warze am rechten Unterarm. Leichter Hohlfuß beiderseits, findet nur schwer passende Schuhe, da sein Spann so hoch sei. Bei Märchen ausdauernd. Neurologisch o. B.

C. Halbgeschwister des Vaters und deren Kinder.

8. August K. (12), geb. 15. 4. 89. In der Schule gut gelernt, gelernter Maschinist, seit 1923 arbeitslos. Wie er glaubt, hat er eine Veranlagung zum Schauspieler in sich, hat auch im Alter von 16—17 Jahren bei einer Schauspielertruppe mitgespielt, wäre gerne dabei geblieben, durfte aber nicht, weil der Vater fürchtete, er käme Sonntags nicht in die Kirche. Mit 30 Jahren ging er in Dortmund-Hörde wieder ans Theater, wurde aber zu schlecht bezahlt und gab es dann wieder auf, weil er damit die Familie nicht ernähren konnte. — „Wenn sie hörten, daß August spielte, war ganz

Hörde da“. — Psychisches Verhalten: freundlich und entgegenkommend, gibt bereitwillig Auskunft, fühlt sich offenbar zu etwas Höherem berufen; leider hätten ihm die Mittel gefehlt, sonst hätte er es als Schauspieler zu etwas gebracht. Großer, kräftig gebauter Mann, welliges Haar, lang nach hinten gekämmt. An der rechten Stirnseite und an der rechten Schläfe mehrere kleine, über das Niveau der Haut hervorragende, weiche Fibrome. Am Rumpf fünf kleine pendelnde Fibrome, im Nacken ein größeres. Der Rumpf ist übersät mit über 40 kleinen Naevi vasculosi. Am rechten Oberschenkel ein Naevus pigmentosus. Abstehende Schulterblätter. Hände und Füße sind normal gebaut. Neurologisch o. B.

9. Franz K. (31), Kind von (12), geb. 10. 12. 14. In der Schule gut gelernt, war SS-Mann, dient augenblicklich bei der Artillerie, wurde vom zuständigen Truppenarzt untersucht: In der Nackengegend vier linfengroße Naevi.

10. August K. (32), Kind von (12), geb. 6. 7. 17. Landwirtschaftlicher Arbeiter. Kräftig, groß. Psychisch unauffällig, spricht wenig. Viele kleine Fibromata pendula am Hals, ein anderes drei fingerbreit unter dem rechten Angulus scapulae. Am Rücken sechs Naevi pigmentosi, viele Akne-Pusteln am Rücken, Brust und im Gesicht. Zahlreiche Comedonen. Hohlfüße, hoher Rist, Schwierigkeit beim Schuhkauf, kann aber gut laufen, auch im losen Acker. Beiderseits 1. Zehe verkürzt, plump, kurzer Nagel (Bildung wie Daumen beim Probanden); auch etwas kurze Daumen. Abstehende Schulterblätter. Neurologisch o. B.

11. Anneliese K. (33), Kind von (12), geb. 2. 1. 24. In der Schule einmal sitzen geblieben. Schmächtiges blondes Mädchen mit geringer Prognathie und unregelmäßiger Zahnstellung im Unterkiefer. Leichte Hohlfußbildung. Im Gesicht Epheliden. Am Hals vier, am linken Oberarm drei, am rechten zwei kleine Naevi pigmentosi. Am Rücken rechts von der Wirbelsäule ein kleines gestieltes Fibrömchen. Stark abstehende Schulterblätter. Neurologisch o. B.

12. Herbert K. (34), Kind von (12), geb. 24. 5. 25. Kräftiger Junge, lernt in der Schule gut. Epheliden, Gesichtshaut sonst rein.

Pfenniggroßer Café-au-lait-Fleck links von der Wirbelsäule, drei größere, schwächer pigmentierte auf der rechten Schulter, am Hals einige kleine Naevi pigmentosi. Neurologisch o. B.

13. Lifelotte K. (35), Kind von (12), geb. 30. 8. 27. Kräftiges Mädchen, lernt gut. Epheliden, sonst Gesichtshaut rein. Drei kleine Naevi pigmentosi am Hals, einer über der rechten Clavikel. Leichte Hohlfüße, die schmerzen, wenn sie viel läuft. Füße kurz, Zehen normal. Abstehende Schulterblätter. Neurologisch o. B.

14. Johanna K. (36), Kind von (12), geb. 3. 12. 29. Blondes, kräftiges Mädchen. An der Haut keine Veränderungen. Hände und Füße normal. Neurologisch o. B.

15. Jos. K. (13), Stiefbruder des Vaters, geb. 25. 11. 95. Zechenarbeiter, verheiratet, keine Kinder (1 Kind mit 11 Monaten gestorben). In der Schule immer gut mitgekommen, war stets gesund. 1916—1920 in französischer Gefangenschaft. Still, ruhig, sehr schweigsam, gibt aber willig Auskunft. Er macht keinen intelligenten Eindruck. Großer kräftiger Mann. Unreine Gesichtshaut. Im Gesicht vier, am Hals zwei weiche, das Niveau der Haut überragende Fibrome. Neun pendelnde Fibrome über den Rumpf verteilt, ein größeres auf der Mitte der rechten Clavicula. Auf der rechten Schulter mehrere kleine und einige bis zehnpfennigstückgroß Café-au-lait-Flecke. Am rechten Oberschenkel zwei kleine Naevi pigmentosi. Füße und Hände normal. Neurologisch o. B. Von seinem Vater wurde mir gesagt, „daß er nicht recht mitmachen wollte, ich solle ihm das nicht übelnehmen, der ist nun einmal ein eigener Mensch“ (Sonderling).

16. Magdalene K. (14), Halbschwester des Vaters, geb. 25. 11. 1898, ledig. War Filialleiterin beim Konsum, führt jetzt selbständig ein Lebensmittelgeschäft. Sie macht einen intelligenten Eindruck, ist aber wenig gesprächig und gibt nur kurz, wenn auch willig Auskunft. Nach den Angaben ihres Bruders August ist sie sehr menschenföu, habe vor der Untersuchung große Angst gehabt, lebe sehr abgeschlossen und gehe fast nie in Gesellschaft. Das Geschäft halte sie nur, weil sie das Geld so liebe, sonst würde sie das Geschäft sicher aufgeben, nur um nicht immer mit fremden Men-

fchen zu tun zu haben. Gesichtshaut glatt, frisch aussehend. An der Nasengegend einige Epheliden. Am Rumpf verstreut 18 kleine Naevi pigmentosi, ein größerer unterhalb des Nabels. Am Rücken links von der Wirbelfäule zwei kleine, neben der rechten Achselhöhle ein linsengroßes, gestieltes Fibrom. Handbreit über der Spina iliaca anterior superior links ein zehnpfennigstückgroßes, gestieltes blumenkohlartiges Fibrom, teils von derber, teils von weicher Konsistenz. Hände und Füße normal. Abstehende Schulterblätter. Neurologisch o. B.

17. Martha K. (15), Halbschwester des Vaters, geb. 28. 10. 03. Ledig, führt dem Vater und der Schwester den Haushalt, war immer zu Hause; in der Wohnung ist es sehr sauber. In der Schule einmal nicht mitgekommen. Gesicht, Oberarme und Halsauschnitt überfät mit Epheliden, am rechten Oberarm zwei kleine Naevi pigmentosi, am Hals drei kleine Fibrome, ein größeres im Nacken. Am Rumpf fünf winzig kleine Fibromata pendula, zwei kleine Naevi vasculosi. Am linken Bein zwei Fibrome. Abstehende Schulterblätter.

D. Halbgeschwister der verstorbenen Mutter und deren Kinder.

18. Franz J. (20), Halbbruder der Mutter, geb. 29. 9. 1893. Im Kriege gefallen. War Hüttenarbeiter. Seiner Frau sind Veränderungen an der Haut nicht aufgefallen. Eine Tochter.

19. Anna J. (46), Tochter von (20), geb. 12. 6. 1917. Verkäuferin. Psychisch unauffällig. Ein kleiner Naevus pigmentosus am rechten Unterkiefer, sieben weitere am Rücken und auf der Brust; Hohlwarzen beiderseits. Hände normal. Leichte Hohlfußbildung auf beiden Seiten. Neurologisch o. B.

20. Bernhard J. (21), Halbbruder der Mutter, geb. 17. 12. 95. Verheiratet, vier Kinder. Kassierer bei der Krankenkasse. In der Schule angeblich stets der beste. Ruhig, spricht wenig. Haut glatt, frisch, ohne Veränderungen. Hände o. B. Beiderseits Senkfuß. Neurologisch o. B.

21. Heinz J. (47), Sohn von (21), geb. 24. 10. 19. In der Schule gut gelernt, Bürolehrling, aufgeweckter Junge, der sich gut zu unterhalten weiß. Am Bauch unterhalb des Nabels drei kleine

pendelnde Fibrome. Am Rücken zwei nicht erhabene pigmentierte Naevi. Plattfüße, die keine Beschwerden machen. Neurologisch o. B.

22. Karola J. (48), Tochter von (21), geb. 9. 10. 21. In der Schule gut mitgekommen, lernt Schneiderei. Nach Angabe des Vaters nervös, leicht aufgeregt. Sie ist schüchtern, spricht nicht viel. Mehrere kleine nicht erhabene Pigmentnaevi an Brust, Rücken und Beinen. Leichte Hohlfußbildung, rechts stärker als links, keine Beschwerden. Neurologisch o. B.

23. Ferdinande J. (49), Tochter von (21), geb. 4. 10. 24. Aufgewecktes, gesprächiges Mädchen. Haut, Gliedmaßen und Nervensystem o. B.

24. Bernh. J. (50), Sohn von (21), geb. 23. 1. 34. Lebhaftes, normal entwickeltes Kind. Haut, Gliedmaßen und Nervensystem o. B.

25. Leo J. (22), Halbbruder der Mutter, geb. 27. 3. 98. Verheiratet, ein Kind. Hüttenarbeiter. In der Schule angeblich gut mitgekommen. Läßt sich willig untersuchen, spricht im übrigen aber kaum. Haut, Gliedmaßen und Nervensystem o. B.

26. Liselotte J. (51); Kind von (22), geb. 6. 1. 28. Sehr aufgeweckt und intelligent. Leidet an „chronischem Bronchialkatarrh“. An der linken Halsseite, linken Schulter und am linken Oberarm mehrere kleine, nicht erhabene Pigmentnaevi, sonst Haut glatt. Hände o. B. Andeutung von Hohlfuß, besonders links. Neurologisch o. B.

27. Anna H., geb. J. (23), Halbschwester der Mutter, geb. 1901, verheiratet, kein Kind. Zugänglich, gesprächig, ziemlich adipös. Haut ganz glatt. Neurologisch o. B. Hände und Füße normal.

28. Auguste St., geb. J. (24), Halbschwester der Mutter, geb. 10. 2. 05, Schreinersfrau, zwei Kinder. Sehr gesprächig, klagt über „nervöse Herzbefwerden“. Am linken Schulterblatt 1,5 cm langer, 0,5 cm breiter, etwas erhabener, regelmäßig begrenzter, weicher Pigmentnaevus, ferner je ein kleiner, nicht tastbarer Naevus auf der Brust und am Knie. Haut sonst ganz frei. Hände und Füße normal. Neurologisch o. B.

29. Gerhard St. (52), Sohn von (24), geb. 10. 9. 28. Soll gut lernen. Haut, Gliedmaßen und Nervensystem o. B.

30. Gisela St. (53), Tochter von (24), geb. 25. 4. 31. Schwäch-
tiges, schüchternes Mädchen, weint bei der Untersuchung. Haut,
Gliedmaßen und Nervensystem o. B.

31. Martin J. (25), Halbbruder der Mutter, geb. 10. 11. 06.
Schlosser, verheiratet, ein Kind. Intellektuell sicher ausreichend be-
gabt. Wirkte zuerst mürrisch und verschlossen, wurde dann aber
zugänglicher. Haut, Gliedmaßen und Nervensystem o. B.

32. Urfula J. (54), Kind von (25). Normal entwickeltes 19
Monate altes Kind. Körperlich o. B.

33. Martin J. (5), Stiefvater der Mutter, geb. 18. 10. 1863 in
Westpreußen. In der Schule gut gelernt. War immer gesund. Seit
1928 Invalide, hat sich in ein Stift eingekauft. Mittelhocher, dicker
Mann, sehr gepflegtes Äußere. Auf dem Rücken zwischen den
Schulterblättern 6 etwas über die Haut hervorragende, linien- bis
pfenniggroße Warzen, ferner am Rücken 8 kleine schwach pigmen-
tierte Naevi, sonst Haut glatt, frisch, ohne Veränderungen. Hände
und Füße o. B. Neurologisch o. B. Er gibt an, daß ihm an der
Haut seiner Frau nie Veränderungen aufgefallen seien, wußte
aber auch nichts von dem Vorhandensein seiner eigenen.

34. Franz K. (4), Stiefvater des Vaters, geb. 3. 6. 1863 in
Ostpreußen. Heiratete die sechs Jahre ältere Mutter des unehelich
geborenen Vaters des Probanden. Er hat die Schule wenig besucht,
„es war das da noch nicht so, im Sommer mußte er das Vieh hüten
und auf dem Felde helfen, aber auch im Winter war er wenig in
der Schule“. Aufgefordert etwas zu lesen, lehnte er ab mit der
Begründung, er könne es nicht sehen, aber er habe auch nie die
Zeitung gelesen, das habe ihm keinen Spaß gemacht. Ebenso lehnte
er Rechenaufgaben ab: „das kann ich nicht, meine Frau hat immer
alles gerechnet“. Im Alter von 24 Jahren hat er die sechs Jahre
ältere Frau geheiratet. Er war mit einer Schwester seiner Frau auf
dem gleichen Gut beschäftigt und diese habe ihm die Heirat ver-
mittelt, gekannt habe er seine Frau schon früher. In den neunzi-
ger Jahren sei er nach H. in Westfalen gezogen. Industriearbeiter
— seit 11 Jahren Invalide. — 73 Jahre alter Mann, 174 cm groß,

in reduziertem Ernährungszustand. Das Sternum springt stark vor, besonders das Manubrium. Schlüsselbeingruben stark eingefallen. Die Schulterblätter stehen stark flügel förmig ab. Haut des Gesichtes nicht glatt, zahlreiche Unebenheiten, über dem linken Auge 2 linsengroße, erhabene, weiche Fibrome; am linken äußeren Augenwinkel am Oberlid 2 kleine etwa 2-3 mm lange Fibromata pendula, desgleichen 9 am Thorax von verschiedener Größe, ferner zahlreiche Fibrome in der Haut, erhaben, gut tastbar. Viele kleine Naevi vasculosi und pigmentosi; ganz kleine und bis zehnpfennigstückgroße Café-au-lait-Flecken am Rumpf und an den Oberarmen. Hände und Füße o. B. Neurologisch: Arm- und Beinreflexe gesteigert, seitengleich, einige klonische Nachzuckungen bei den Patellar- und Achillessehnenreflexen. — Er macht einen wenig intelligenten Eindruck, ist wenig gepflegt, was bei der sonst sehr sauberen Umgebung besonders auffällt. Der Untersuchung macht er keine Schwierigkeit. — Von seiner Tochter Martha wird uns nachher angegeben: der Vater sei in der Jugend etwas Sonderling gewesen, er habe sich von allen zurückgezogen, unter Menschen nicht wohlgefühlt, später, als er verheiratet war, habe sich das etwas gelegt. Als Junggefelle und auch, als er verheiratet war, „ging er schon mal gern nebenher, für nette Mädchen habe er immer etwas übrig gehabt“. Das wisse sie von ihrer Mutter.

Auf einem Familienbild ist die Mutter des Vaters (2) sehr korpulent, nicht groß. Im Gesicht sind keine Unebenheiten oder Flecken zu erkennen. Der Kopf ist normal konfiguriert. Die Tochter gibt an, daß die Mutter eine reine Haut gehabt habe. Es sei ihr nie etwas von Warzen, Flecken oder dergleichen an der Haut aufgefallen, als sie die Mutter vor ihrem Tode sechs Wochen gepflegt und immer gewaschen habe. Die Mutter sei viel klüger gewesen als der Vater.

Wir haben bei unserer Untersuchung folgende Anomalien gefunden:

1. Pigmentanomalien (große und kleine Recklighausenflecke und Naevi pigmentosi),

2. Haut- und Nerventumoren,
3. Naevi vasculosi,
4. Störungen der Psyche und des Intellekts,
5. Skelettanomalien,
6. Augenstörungen,
7. Akne-Pusteln und Comedonen,
8. Abstehende Schulterblätter,
9. Hohlwarzen,
10. Hohlfüße.

Im folgenden Teil der Arbeit wird zunächst darauf eingegangen, ob die gefundenen Störungen nach den in der Literatur gefundenen Angaben auf der bei der Recklinghausenschen Krankheit vorhandenen Keimanomalie beruhen und wie weit sie mit dieser Erkrankung in Beziehung stehen.

Nach der Häufigkeit nehmen die bei unseren Untersuchungen gefundenen Pigmentanomalien bei weitem den ersten Platz ein. Pigmentnaevi sind nach Barthélémy und Levi, Siemens so häufig, daß es kaum einen Menschen gibt, der nicht irgendwelche Naevusform hat. Über die Entstehung der Naevi pigmentosi, Naevi spili und der Recklinghausenflecke und ihre Beziehungen zueinander herrscht unter den Fachgelehrten noch keine einheitliche Auffassung.

Schon Virchow hat die fleckige Verteilung des Pigments in der normalen Haut erkannt, und sie ist von ihm zuerst beschrieben worden. Diese eigenartige fleckweise Verteilung des Pigments in der Haut führt unter der Einwirkung des Sonnenlichtes zum Auftreten der Epheliden. Auch diese sind, wie die Untersuchungen von Hammer und Meirowsky klar beweisen, keimplasmatisch bedingt, doch liegt hier keine Mißbildung vor, da ihr Auftreten auf der schon normalerweise vorhandenen fleckweisen Verteilung des Pigments beruht. Nach Meirowsky ist eine scharfe Abgrenzung zwischen Epheliden und Naevi spili bzw. Lentigines nicht möglich. Auch Jarisch betont, daß eine klinische Trennung nicht möglich sei und daß auch pathologisch-anatomisch keine Un-

terfchiede beſtehen, fofern bei den Lentigines noch keine Zelleinlagerungen im Chorion vorhanden ſind.

Für die Entſtehung der Naevi ſind verſchiedene Theorien aufgeſtellt. Soldan konnte ſchon 1899 einen kontinuierlichen Zusammenhang der Naevuszellneſter in der Region der Papillen mit fibröſen Zellwucherungen in den tieferen Schichten der Cutis verfolgen. Er ſchloß daraus, daß die zelligen Naevi als Tumoren der bindegewebigen, markloſen Scheiden der Nervenausbreitungen, als Neurofibrome aufzufaſſen ſind.

Hallopeau, Jadassohn, Simon nahmen für die Entſtehung der ſyſtematiſierten Naevi eine aetiologiſche Bedeutung der Nerven an. Für dieſe Annahme ſpricht auch die Tatſache, daß man experimentell nach Durchtrennung eines Nerven im zugehörigen Hautgebiet Pigmentbildung beobachtet hat. Da aber viele ſyſtematiſierte Naevi weder den Verlauf noch das Verbreitungsgebiet von Nerven innehalten, iſt die aetiologiſche Bedeutung der Nerven für die Entſtehung der Naevi verlaſſen worden.

Andere Autoren verſuchen die Naevi mit Hilfe der Entwicklungsgichte zu erklären (Kopp, Pfeiffer, O. Simons, Delbanc).

Wegen der bei der Recklinghauſenſchen Krankheit ſo regelmäßig vorhandenen Pigmentflecke hat E. Hoffmann als erſter 1917 auf die Bedeutung der Recklinghauſenſchen Erkrankung in der Naevusfrage hingewieſen und glaubt im Anſchluß an die Unterſuchungen von Verocay und Kyrle über die Entſtehung der Neurinome aus den Nervenmutterzellen, daß auch gewiſſe zellige Naevi von Nervenmutterzellen herrühren können.

Mit der gleichen Frage hat ſich dann Maſſon eingehend befaßt und gefunden, daß die Pigmentnaevi einerſeits aus einem Syncytium von letzten Endes Schwannſchen Zellen beſtehen und andererseits in ihnen eine viel größere Zahl von Neuriten vorhanden iſt als in der unveränderten Lederhaut. Er iſt daher der Anſicht, daß die Pigmentnaevi ſowohl Neurinome wie Neurome ſind. Er ſchließt ſich der Anſicht Soldans an und hält die Pigment-

mäler für Tumoren der Endausbreitungen sensibler Nerven, vor allem aus Schwannschen Zellen bestehende Geschwülste und bezeichnet daher die Pigmentnaevi als Neuronaevi.

In gewissen Familien treten die Naevi auffallend häufig auf, worin Darrier und Jadassohn eine hereditäre Disposition der Naevi erblicken. Beobachtungen des Auftretens von Naevi genau an denselben Stellen, wo sie sich auch bei Eltern und Großeltern befunden haben, beweisen die hereditäre Komponente in der Naevuslehre.

Auf Grund einer vererbungswissenschaftlichen Analyse der Haut hat dann Meirówky die keimplasmatische Naevustheorie aufgestellt.

Sehr eingehend hat sich Siemens mit dem Studium der Pigmentanomalien bei der Recklinghausenschen Krankheit beschäftigt, und er fand dabei, daß es wesentliche Unterschiede zwischen den naevusähnlichen Erscheinungen der Recklinghausen-Kranken und den Naevi der Normalen gibt. Zu seinen Untersuchungen standen ihm 18 Recklinghausen-Kranke zur Verfügung. Bei allen fanden sich große Recklinghausen-Flecke, und ihre große erbliche Disposition war sehr deutlich. Im Gegensatz hierzu gelang es Siemens nicht, von 117 Naevi spili bei einigen Zwillingen eine erbliche Disposition nachzuweisen. Die offenbar bestehenden aetiologischen Differenzen veranlaßten ihn nun auch, das klinische Bild näher zu studieren. Während der Unterschied in der Farbe, den er zwar auch fand, nicht so deutlich war, erschien ihm der Unterschied des Randes sehr eindrucksvoll. Die großen Recklinghausen-Flecke sind glattrandig, und die Naevi spili haben einen deutlich gezackten Rand, wodurch beide differentialdiagnostisch leicht zu unterscheiden sind.

Auch die kleinen Recklinghausen-Flecke, die von vielen Autoren kurzweg Epheliden, von anderen ephelidenartig bezeichnet werden, fanden sich bei allen 18 Fällen. Für sie fand Siemens ebenfalls, daß sie klinisch gut von den Epheliden zu trennen sind, und zwar weniger durch ihre Farbe und Form, sehr deutlich dagegen durch ihre Lokalisation. Während die Entstehung der Ephe-

liden meist der Lichteinwirkung unterworfen ist und ihre Lokalisation der natürlichen Lokalisation des Pigments am Körper parallel geht, bevorzugen die kleinen Recklinghausen-Flecke besondere Körperregionen und sind nicht abhängig von der normal vorhandenen Verteilung des Pigments. Solche Prädilektionsstellen für die kleinen Recklinghausen-Flecke sind der Nacken, die Gürtelgegend zwischen Nabel und Mamillen und die Achselhöhlen nebst deren Umgebung.

Siemens schlägt daher vor, als Naevi spili nur die betreffenden Flecken des Normalen, die der Recklinghausen-Kranken als „große Recklinghausenflecke“ und die kleinen Pigmentflecke zur Unterscheidung von Epheliden als „kleine Recklinghausenflecke“ zu bezeichnen.

Durch seine Untersuchungen kam Siemens zu dem Schluß: „daß ein gehäuftes Vorkommen typischer Naevi bei Recklinghausenkranken bis jetzt vollständig unbewiesen ist. Die engen Beziehungen der Neurofibromatosis zu den Gebilden, welche wir bei den Normalen als Naevi bezeichnen, erweisen sich bei näherem Zusehen als illusorisch.“

Auch bestreitet Siemens die häufige familiäre Häufung der Muttermaler, wodurch auch nach seiner Ansicht, wenn sie vorhanden wäre, ihre erbliche Natur bewiesen wäre. Diese Annahme deckt sich aber nicht mit den Erfahrungen und klinischen Beobachtungen anerkannter Autoren der Dermatologie. Jadassohn, Darrier, O. Simon, E. Leffler, Kaposi, Hutchinson, Jelfoneck, Bettmann betonen die Erbllichkeit der Naevi.

Die Auffassungen von Siemens sind nicht unwiderprochen geblieben. Meirowsky erkennt den Schluß Siemens nicht an, da auch in den Zeichnungen der großen Recklinghausenflecke in der Arbeit von Siemens alle Übergänge sowohl bei Recklinghausen-Kranken wie bei Gefunden von glattrandigen zu gezacktrandigen Typen vorhanden sind. Für die gleiche aetiologische Bedeutung beider Formen führt er, neben anderen eigenen Beobachtungen, einen Fall an, bei dem eine Mutter mit hauptsächlich

glattrandigen Flecken auf eine Tochter ebenfalls glattrandige, auf eine andere Tochter fast nur gezacktrandige Formen vererbt habe. Da weder bei der Mutter noch bei beiden Töchtern ein Recklinghausen nachweisbar sei, könne man auch keine Trennung der Recklinghausen-Flecke von den Naevi spili durchführen.

Im Gegensatz zu Saalfeld, der sich der Siemens'schen Anschauung angeschlossen hat, lehnt auch Scholz eine Unterscheidung zwischen Recklinghausen-Flecken und Naevi ab und hält, wie vor Siemens die Mehrzahl der Dermatologen, die Recklinghausen-Flecke für echte Naevi.

Burkle de la Camp hat im Jahre 1931 histologische Untersuchungen von Pigmentmälern sowohl bei Gefunden als auch bei Recklinghausen-Kranken vorgenommen. Hierbei fand er, daß die vom Unterhautfettgewebe heraufziehenden Nerven sich aufteilen und stellenweise von eigenartigen fibromatösen Gewebsträngen begleitet werden, welche meist an der Grenze von Haut und Unterhautfettgewebe beginnen. Am besten war das Bild bei jungen, eben beginnenden Veränderungen erkennbar. Serienschnitte zeigten, daß es sich nicht immer um eigentliche Zellnester, sondern bisweilen um netzartige Gebilde handelt, welche durch Stränge fibromatösen Gewebes miteinander verbunden sind. In diesen geflechtartigen Strängen finden sich Nervenfasern. Die Pigmentmäler sind oft die ersten erkennbaren fibromatösen Veränderungen des Bindegewebes der Hautnerven, und Burkle de la Camp spricht sich für die Zugehörigkeit der Pigmentmäler zu den vom Nervenbindegewebe abgeleiteten Fibromatosen aus. Seine Untersuchungen haben ergeben, daß die Pigmentnaevi der Gefunden histologisch denselben Charakter aufweisen wie die der Recklinghausen-Kranken.

Die Aetiologie und Vererbungsfrage der Pigmentanomalien sowohl im allgemeinen als auch bei der Recklinghausenschen Krankheit im besonderen ist noch keineswegs geklärt. Es stehen sich gegenüber die Ansichten von Siemens und Meierowfsky. Siemens macht einen Unterschied zwischen Recklinghausen-Flecken und Pigmentnaevi und bestreitet die Erblichkeit des ein-

zelenen Naevus. Er nimmt deshalb nur eine allgemeine erbliche Disposition für die Naevusbildung an, während Meirowsky Recklinghausen-Flecken und Naevi für gleich hält und die Ursache für die Entstehung der Naevi in der Veränderung in der keim-plasmatischen Anlage gewisser Hautpartien, also im Idiotypus verankert sieht.

Eine Klärung dieser Frage könnten die Beobachtungen an eineiigen Recklinghausenkranken-Zwillingen ergeben. Bei der ausgesprochen geringen Fruchtbarkeit der Recklinghausen-Kranken sind diese aber sehr selten. Bei der Durchsicht der Literatur hat Verfasser nur einen Fall von eineiigen Recklinghausen-Zwillingen in der Arbeit von Blotzvogel gefunden, wo sie in einer vorläufigen Mitteilung aber nur erwähnt werden, so daß die Angaben für diese Untersuchung nicht verwertbar sind.

In der neueren Literatur scheint sich die Ansicht von Siemens bezüglich der großen und kleinen Recklinghausen-Flecke immer mehr durchzusetzen, und sie werden ganz allgemein zu den Kardinalsymptomen gerechnet.

Nach den Angaben der meisten Autoren treten aber bei der Recklinghausenschen Erkrankung Pigmentnaevi vermehrt auf, und ein gehäuftes Auftreten in einer Recklinghausenkranken-Familie spricht auch nach der Ansicht von Siemens, wenn es tatsächlich erwiesen ist, was Siemens aber ablehnt, für ihre keimplasmatische, also idiotypische Genese.

Bei den Hautveränderungen, die wir gefunden haben, treten neben denen der Farbe solche des Niveaus, also Geschwülste verschiedener Gestalt und Herkunft und schließlich Kombinationen von beiden, nämlich pigmentierte Geschwülste auf. Es sind erstens die weichen Fibrome, zweitens die Geschwülste der Nerven bzw. der Nervencheiden, die Neurofibrome oder besser Neurinome zu nennen. Die solitären weichen Fibrome sind Geschwülste sui generis, während man den multiplen Naevuscharakter beimißt, und sie zu dem Symptomenkomplex der Recklinghausenschen Krankheit zählt. Weiche Fibrome treten bei der Recklinghausenschen

Krankheit teils in wenigen Exemplaren, meist aber in größerer Zahl auf.

Die Auffassung über die Hauttumoren, die Fibrome Recklinghaufens hat durch die Untersuchungen von Verocay eine grundlegende Änderung erfahren insofern, als wir sie nicht mehr als mesodermal-bindegewebige, sondern als aus einem eigenartigen neurogenen, also ektodermalen Gewebe auffassen. Über ihre Histogenese ist allgemein anerkannt, daß diese Tumoren von der Nervenscheide ausgehen, die aus einem ektodermalen und einem mesodermalen Anteil besteht. Während v. Recklinghausen die Geschwülste von der bindegewebigen Scheide ableitete, wird seit Verocay der Ursprung dieser Geschwülste in den ektodermalen Anteil verlegt. Herxheimer und Roth haben gezeigt, daß am Aufbau der Tumoren neben dem aus Schwannschen Zellen hervorgegangenen Gewebe auch eine bindegewebige Komponente, also mesodermales Gewebe beteiligt ist, deren Anteil von Tumor zu Tumor wechselt. Besonders ältere Tumoren zeigen eine vermehrte bindegewebige Durchsetzung, die so stark fein kann, daß auch histologisch der Neurinomcharakter nicht mehr oder nur schwer zu erkennen ist. Es liegen histologische Untersuchungen der Hautgeschwülste in großer Zahl vor. Wenn wir die Ergebnisse kurz zusammenfassen, so ergibt sich etwa folgendes. Die meisten Untersucher konnten in den Tumoren keinerlei nervöse Elemente nachweisen, während andere eine Wucherung der Schwannschen Zellen fanden. Andere Autoren, besonders Verocay, haben bei ihren Untersuchungen einwandfrei nervöses Gewebe nachgewiesen. Nur in relativ jungen Tumoren ist meist, wie Kyrle hervorhebt, ein charakteristischer histologischer Befund möglich, da in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle in älteren Geschwülsten die eventuell vorhanden gewesenen Nervenfasern durch Bindegewebe ersetzt werden.

Die Hautgeschwülste sind somit als Mischformen ektodermalen und mesodermalen Gewebes zu bezeichnen, deren Genese auf eine Störung dieser Keimblätter, die keimplasmatisch bedingt ist, zu-

rückgeführt wird. Sie gehören wie die Pigmentanomalien ebenfalls zu den Kardinalsymptomen der Recklinghausenschen Krankheit.

Ebenso umstritten wie die Naevi pigmentosi ist die Frage der Naevi vasculosi. Schon die vielen Bezeichnungen wie Gefäßmal, Feuermal, rotes Muttermal, Naevus vascularis, Naevus telangiectaticus, Naevus haemangiectaticus, Angioma cavernosum, Angioma simplex sind bezeichnend für die noch herrschende Unklarheit über alle diese Gebilde, die weder pathologisch-anatomisch noch klinisch gegeneinander abzugrenzen sind. Für den Pathologen ist es schwer sicher zu entscheiden, ob es nur Ektaisien oder auch Neubildungen sind, und dem Kliniker bieten die genetisch verschiedenen Typen in ihrer Erscheinungsform oft weitgehende Übereinstimmung, so daß eine befriedigende Einteilung nicht erfolgen kann. Es ist praktisch nicht möglich, die Gefäßgeschwülste von den Angiektasien scharf abzugrenzen.

Auch hat die Frage nach der Aetiologie und Pathogenese dieser Bildungen noch keine einheitliche Lösung gefunden. Einzelne Autoren vermuten, daß die Naevi vasculosi in das Gebiet der Fehlbildungen bzw. Gefäßhyperplasien fallen, während die Mehrzahl der Autoren für alle Angiome eine kongenitale Grundlage annimmt. Wie in der Frage der Naevi pigmentosi, so stehen auch in der Frage nach dem Wesen und der Herkunft der Gefäßmäler die Auffassungen von Meir ow s k y und Si e m e n s sich schroff gegenüber, die für beide Anomalien die gleiche Aetiologie annehmen. Mag auch die Aetiologie und Pathogenese der Gefäßmäler noch umstritten sein, so scheint doch festzustehen, daß alle diese Bildungen kongenital bedingt sind, dabei kann es sich um eine angeborene Gewebsschwäche im Sinne von C u r t i u s, um eine intrauterine Schädigung der Vasoconstrictoren im Sinne von B u s c h k e oder auch um andere Faktoren handeln. Es ist kennzeichnend für idiotypische Hauterkrankungen, daß sie stets mit verschiedenen Naevusbildungen und, worauf J a d a s s o h n hinweist, mit Mißbildungen vergesellschaftet auftreten, die ihrer Natur nach als Keimesstörungen aufzufassen sind. Somit haben wir wohl die Berechtigung, auch die bei unseren Untersuchungen ge-

fundenen Naevi vasculosi auf eine Schädigung des Keimplasmas zurückzuführen.

Psychische Störungen spielen eine ganz wesentliche Rolle im Recklinghausen-Symptomenkomplex. Die Angaben über die Häufigkeit des Vorkommens geistiger Störungen bei der Recklinghausenschen Erkrankung sind sehr verschieden. Manche Autoren betonen die Seltenheit psychischer Störungen. So lehnt *Higman* die Zugehörigkeit der geistigen Schwäche zum Recklinghausen-Symptomenkomplex ab. *Whitfeld*, *Dore* und *Stark* äußern sich in ähnlichem Sinne, und *Bidde*, *Nobel* erwähnen ausdrücklich die besondere Intelligenz ihrer typischen Fälle.

Recklinghausen und vor ihm schon *Hebra* haben darauf hingewiesen, daß psychische Störungen bei der Recklinghausenschen Krankheit vorkommen. *Darrier* muß dieselben für sehr häufig halten, da er sie zu den klassischen Symptomen der Krankheit rechnet. Die gleiche Ansicht vertritt auch *Tyzzenko*. *Adrian* hält sie für einen „integrierenden Bestandteil“ der Recklinghausenschen Erkrankung.

Man findet bei den Kranken als schwächste Form der psychischen Störung bei sonst vollwertigen Leuten oft nur ein eigenartiges psychisches Verhalten oder ein gewisses umständliches Wesen oder auch Neuropathien und Schwachsinne in allen Abstufungen von eben nur angedeutetem Schwachsinne bis zur Idiotie und häufig auch Epilepsie.

Es erhebt sich nun die Frage, ob alle diese Zustände rein funktionell sind oder ob organische Veränderungen in Form einer Entwicklungsanomalie am Zentralnervensystem diese psychischen Veränderungen bedingen.

In einer Reihe von Fällen finden wir Zurückbleiben in der geistigen und körperlichen Entwicklung, so ein Verharren auf einem kindlichen Stadium, Zurückbleiben im Längenwachstum, fehlende oder später einsetzende sekundäre Geschlechtsmerkmale. Diese Fälle dürften wohl auf pluriglandulären endokrinen Störungen beruhen. So berichtet *Temple* über einen Fall, bei dem

er die Beteiligung fast sämtlicher endokrinen Drüsen feststellen konnte.

Wir wissen aber, daß die Entwicklungsstörung bei der Recklinghausenschen Krankheit sich nicht nur auf der Haut, sondern in manchen Fällen mehr oder sogar ausschließlich am Zentralnervensystem äußert als zentrale Form der Neurofibromatose. Als pathologische Veränderungen am Zentralnervensystem kennen wir Tumoren des Gehirns, des Rückenmarks (Neurinome), ferner finden sich nach den Untersuchungen, besonders von B i e l f c h o w s k y , als Folge der dysgenetischen Störung der Spongioblasten bei im übrigen normalem Bau der Rinde und der grauen Substanz überhaupt Spongioblastenherdchen und Zellischwärme besonders gehäuft in der Umgebung der Ventrikel.

Ob und in welchem Umfange diese pathologisch-anatomischen Prozesse für psychische und neurologische Störungen verantwortlich gemacht werden können, dafür ließen sich in der Literatur keinerlei Angaben finden. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang, daß diese psychischen Störungen degenerativen Charakters neben der Recklinghausenschen Krankheit und der ihr nahestehenden tuberösen Sklerose auch bei verschiedenen anderen, nach heutiger Auffassung gleichfalls auf fehlerhafter Anlage beruhenden und zu dem Erbkreis der Spongioblastosen zu rechnenden Dermatosen beobachtet werden.

Nach den bei der tuberösen Sklerose erhobenen Hirnbefunden steht es wohl außer Zweifel (H. F i s c h e r), daß wir die Ursache für die geistigen Störungen und die Epilepsie in diesen Fällen in den organischen Hirnveränderungen suchen müssen, sie also letzten Endes auf Störungen der Erbinheiten des Keimplanes für das Ektoderm zurückzuführen sind. Bei der engen Verwandtschaft der tuberösen Sklerose und der Recklinghausenschen Erkrankung sowohl in den klinischen Symptomen als auch in genetischer Beziehung sind die beim Morbus Recklinghausen so häufig gefundene geistige Schwäche und die Störungen des Intellekts und der Psyche ebenfalls nicht als zufällige Befunde aufzufassen, sondern wir werden wie bei der tuberösen Sklerose ebenfalls die Ursache für die

geistigen Störungen in den organischen Veränderungen, welche die Krankheit in dem Zentralnervensystem macht, suchen dürfen.

Den Veränderungen am Skelettsystem bei der Recklinghausen'schen Krankheit hat man in letzter Zeit größere Aufmerksamkeit geschenkt. Ihre große Bedeutung im gesamten Krankheitsgeschehen der Neurofibromatose ist besonders von Valentin hervorgehoben worden. Die Knochenveränderungen bestehen nach Korn in Defekt- und Spaltbildungen an den Röhrenknochen, Rippen und Wirbeln, in partiellen Hypertrophien, Atrophien und Ufuren besonders an den Schädelknochen, in Exostosenbildungen, in partiellen Wachstumshemmungen und Wachstumssteigerungen, in Verkrümmung der Wirbelfäule und langen Röhrenknochen und schließlich in strukturellen Veränderungen.

Diese Störungen sind zum Teil angeboren und beherrschen dann meist das klinische Bild, zu dem Haut- und Nerventumoren erst später hinzutreten, oder sie treten erst im Laufe der Entwicklung ein. Letztere können durch Dysfunktion inkretorischer Drüsen, unter denen die Hypophyse die Hauptrolle spielt, bzw. des vegetativen Nervensystems, die trophische Störungen am Skelettsystem bedingen, erklärt werden. Sie haben einen deutlich evolutiven Charakter, und man rechnet sie daher zu den akzessorischen Faktoren der Neurofibromatose. Deformierung und Ufuren am Knochen durch Druck und Zug von Tumoren sind häufig beschrieben. Röntgenologisch wurden öfter Zysten in Knochen beobachtet, die durch typische Recklinghausen-Tumoren, die von Perioftnerven ausgehen und als Zysten imponieren, gebildet werden. Auch wird in vielen Fällen eine Veränderung der Sella turcica gefunden, ohne daß die Hypophyse mitbeteiligt ist. Diese Veränderung wird von manchen Autoren durch erhöhten intracraniellen Druck erklärt. Für die Aetiologie der Krankheit selbst dürften diese Faktoren kaum in Betracht kommen.

Für einen Teil der Fälle mit angeborenen Veränderungen der Knochen, die mitunter familiär auftreten, reicht die histogenetische Erklärung Neurinom nicht aus. Zahlreiche Beobachtungen weisen darauf hin, daß diese knöchernen Veränderungen unabhängig von

einem lokal wirkenden Tumor bereits vorhanden waren (Dombrowski) oder daß sie nicht durch trophoneurotische Störungen des Knochens bedingt sind. Grenet, Ducroquet, Isaac-Georges und Macé berichten von einer typischen Recklinghausen-Erkrankung mit Sakralisation des fünften Lendenwirbels, Skoliose und einer Hypertrophie der rechten oberen Extremität, ferner bei einem fünfzehnjährigen Knaben mit einigen Café-au-lait-Flecken in der Lendengegend das Syndrom Klippel-Feil (3 Halswirbel). Laiguel-Lavaftine, Valance beobachteten ausgedehnte Knochendefekte des Schädels, die sie auf Fehlen der entsprechenden Knochenkerne zurückführten. Frangenheim fand bei einer Obduktion teilweises Fehlen des Daches der Orbita und einen großen Defekt an der Schädelbasis. Es fehlten die großen und ein Teil der kleinen Keilbeinflügel, die seitliche Augenhöhlenwand und ein Teil der mittleren Schädelgrube. Er gibt an, daß die Entstehungsursache dieser Knochendefekte bei der Neurofibromatose noch nicht bekannt sei.

Die Neurofibromatose ist nicht nur eine Systemerkrankung im Ektoderm sondern auch des mesenchymalen Gewebes. Von diesem Standpunkt aus gesehen ist ein Teil der Knochenveränderungen bei der Recklinghausenschen Krankheit nicht als zufällige Komplikation anzusehen, sondern beruht auf einer Minderwertigkeit von Mesenchymderivaten. So berichtet auch Guzmán über erhebliche Knochendefekte am Schädel, die er auf eine pathologische Keimanlage im Mesenchym zurückführt.

Diese Knochenveränderungen treten sowohl beim voll ausgebildeten Bild der Neurofibromatose als auch bei den Abortivformen auf. Grenet, Ducroquet, Isaac-Georges und Macé, die sich besonders mit Knochenveränderungen bei Abortivformen befaßt haben, konnten in einem Jahr 15 Fälle der rudimentären Form der Recklinghausenschen Erkrankung mit Veränderungen am Skelett feststellen. Die Mitbeteiligung des Skelettsystems an den Anomalien besagt daher nicht viel über die Schwere der Erkrankung.

Beachtenswert sind auch bei der Recklinghausenschen Erkrankung die Veränderungen am Auge, und zwar sowohl die des äußeren Auges als die des Augenhintergrundes. Neurofibrom des Augenlides ist oft beschrieben worden. Morawitz beschreibt Neurofibromatosis und Elephantiasis der Lider, ein Rankenneurom am Oberlid, ferner Pigmentflecke der Iris. Scherber beobachtete rechts Amaurose, links hochgradige Myopie und Veränderungen der Aderhaut. Van-der-Hove Neubildungen der Retina. Tyzenko fand Cataracta polaris und Atrophia nervi optici. Kratkow berichtet über einen Recklinghausen-Kranken, bei dem rechts normaler Visus vorhanden war, während der linke Augapfel aus unbekannter Ursache atrophisch war. Eine eingehende Arbeit widmet H. Fischer den Augenerscheinungen. Er fand einen Naevus pigmentosus der Conjunctiva bulbi, Pigmentanhäufung in Klumpen in der Iris, zweimal eine Konusbildung, einmal eine Arteria hyaloidea persistens. Bei zwölf Recklinghausen-Kranken konnte er viermal das Vorkommen markhaltiger Nervenfasern auf der Retina feststellen. Fischer faßt das Auftreten markhaltiger Nervenfasern in der Netzhaut als ein Symptom der Recklinghausenschen Krankheit auf, das den anderen Symptomen koordiniert ist, das auf eine Stufe zu stellen ist mit den übrigen Bildungsanomalien dieser Krankheit. Er tritt ebenso wie Tyzenko für die Bedeutung genauer Augenuntersuchung, besonders auch bei den Formes frustes zur Sicherung der Diagnose ein.

Wir fanden bei unserem Probanden: alternierendes Schielen, Maculae corneae, Hornhautastigmatismus, links Emmetropie, die Papille beiderseits temporal weißlich gefärbt.

Die so vielfach bei der Recklinghausenschen Krankheit beobachteten Veränderungen an den Augen können zwar nicht alle direkt mit der Nervencheidenerkrankung in Beziehung gebracht werden, sie sind aber auch nicht als rein zufällig anzusehen.

Das gleiche gilt von den weiteren bei unseren Untersuchungen gefundenen Anomalien wie Hohlwarzen (46), Akne-Pusteln und Comedonen (31), Senkfüße (21), (47), Hohlfüße (11), (14), (35), (41), (46), (48), (51), abstehende Schulterblätter (12), (14), (15),

(32), (33), (34). Alle diese Störungen treten ebenfalls häufig familiär auf und können auf einer Anomalie des Keimplasmas beruhen. In der Literatur finden sich keine Angaben darüber, daß die angeführten Mißbildungen bei der Recklinghausenschen Krankheit gefunden worden sind und ob sie als akzidentelle ätiologische Faktoren zu bewerten sind.

Ball bemerkt zu den Komplikationen der Recklinghausenschen Erkrankung, daß alle diese Störungen „nicht infolge der Recklinghausenschen Krankheit, sondern nur auf dem gleichen Boden erwachsen und ganz unabhängig im Auftreten überhaupt, in ihrer Art und Stärke auftreten“. Er rückt den Gesichtspunkt der allgemeinen degenerativen Konstitution als Basis der Pathogenese der Recklinghausenschen Krankheit sehr in der Vordergrund. Die gefundenen Anomalien werden als Erscheinungen einer durch minderwertige Anlage bedingten „heredo-degenerativen Allgemeinerkrankung“ aufgefaßt, zu der auch der Recklinghausensche Symptomenkomplex als Teilerrscheinung gerechnet wird.

Es folgt nun eine Zusammenstellung der untersuchten Personen und der bei ihnen gefundenen Anomalien. Da die Eltern des Probanden beide uneheliche Kinder sind, treffen wir folgende Einteilung der Untersuchten:

(Die in Klammern stehenden Zahlen beziehen sich auf die Nummern der Sippentafel).

- A. Proband (39), sein Vater (11), seine fünf Geschwister (38), (40), (41), (42), (43), und das Kind eines Bruders (55).
- B. Stiefvater des Vaters (4), die vier Halbgeschwister des Vaters, (12), (13), (14), (15), und deren fünf Kinder, (32), (33), (34), (35), (36).
- C. Stiefvater der Mutter (5), die fünf Halbgeschwister der Mutter, (21), (22), (23), (24), (25), und deren neun Kinder, (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54).

A. Proband, Vater, fünf Geschwister und ein Kind.

1. F. O. (39) Proband, 26 Jahre; 58 Fibrome und Neurofibrome, einige große und zahlreiche kleine Recklinghausen-Flecke,

zahlreiche stark pigmentierte Naevi; als Skelettanomalien auffallend kurze Hände und kurze Metatarsalia, untere Extremitäten relativ kurz, Skoliose der Wirbelsäule, Deformität der Sella tucica, großer Gehirnschädel, Fehlen der vier Weisheitszähne und eines Molaren, kurze plumpe Daumen; Augenanomalien; Reflexveränderungen, Debilität, Ventrikelsystem nicht darstellbar.

2. A. O. (11) Vater des Probanden, 52 Jahre; mehrere Fibromata penula, einzelne Naevi vasculosi, beiderseits Hohlfuß; überdurchschnittlich begabt.

3. A. K. (38) Schwester des Probanden, 28 Jahre; ein Pigmentnaevus; sonst o. B.

4. A. O. (40) Bruder des Probanden, 25 Jahre; mehrere Pigmentnaevi, davon einer erhaben, drei Fibrome.

5. M. O. (41) Schwester des Probanden, 24 Jahre; mehrere Naevi pigmentosi, davon einer erhaben, beiderseits deutlicher Hohlfuß.

6. H. C. (42) Schwester des Probanden, 21 Jahre; ein glatter und viele deutlich erhabene Pigmentnaevi; kurze plumpe Daumen.

7. J. O. (43) Brudes Probanden, 14 Jahre; ein erhabener Pigmentnaevus.

8. E. O. (55), zehn Tage altes Kind von (40); o. B.

B. Stiefvater des Vaters, Halbgeschwister des Vaters und deren Kinder.

9. F. Kl. (4) Stiefvater des Vaters, 71 Jahre; zahlreiche Fibrome, darunter 11 Fibromata pendula, kleine und große Recklinghausen-Flecke, viele Naevi pigmentosi und Naevi vasculosi, absteigende Schulterblätter, Intelligenzmangel, Sonderling.

10. A. Kl. (12) Halbbruder des Vaters, 47 Jahre; mehrere weiche Fibrome, sechs pendelnde Fibrome, ein Naevus pigmentosus, über vierzig Naevi vasculosi, absteigende Schulterblätter.

11. J. Kl. (13) Halbbruder des Vaters, 41 Jahre; mehrere Fibrome in der Haut, neun pendelnde Fibrome, kleine und große Recklinghausen-Flecke, zwei Naevi pigmentosi, Sonderling.

12. M. Kl. (14) Halbschwester des Vaters, 38 Jahre; vier gefielte Fibrome, 18 Naevi pigmentosi, abstehende Schulterblätter, Sonderling.

13. Ma. Kl. (15) Halbschwester des Vaters, 33 Jahre; 11 Fibrome, darunter 5 kleine Fibromata pendula, 2 Naevi vasculosi, abstehende Schulterblätter, in der Schule einmal nicht mitgekommen.

14. A. Kl. (32) Sohn von (12), 19 Jahre; viele kleine Fibromata pendula, 6 Naevi pigmentosi; Akne-Pusteln und Comedonen; Hohlfüße, beiderseits erste Zehe kurz, plump; abstehende Schulterblätter.

15. An. Kl. (33) Tochter von (12), 12 Jahre; 9 Naevi pigmentosi, ein gefieltes Fibrömchen; Prognathie, unregelmäßige Zahnstellung im Unterkiefer, stark abstehende Schulterblätter; in der Schule einmal nicht mitgekommen.

16. H. Kl. (34) Sohn von (12), 11 Jahre; 4 große Recklinghausen-Flecke, einige kleine Naevi pigmentosi.

17. L. Kl. (35) Tochter von (12), 9 Jahre; 4 Naevi pigmentosi, leichte Hohlfußbildung, abstehende Schulterblätter.

18. J. Kl. (36) Tochter von (12), 6 Jahre; o. B.

C. Stiefvater der Mutter, Halbgeschwister der Mutter und deren Kinder.

19. M. J. (5) Stiefvater der Mutter, 71 Jahre; 6 Warzen, 8 kleine Pigmentnaevi.

* 20. B. J. (21) Halbbruder der Mutter, 40 Jahre; Senkfüße, sonst o. B.

21. L. J. (22) Halbbruder der Mutter, 38 Jahre; o. B.

22. A. H. (23) Halbschwester der Mutter, 35 Jahre; o. B.

23. A. St. (24) Halbschwester der Mutter, 31 Jahre; 3 Naevi pigmentosi.

24. M. J. (25) Halbbruder der Mutter, 30 Jahre; o. B.

25. A. J. (46) Tochter von (20), 19 Jahre; 8 kleine Naevi pigmentosi; Hohlwarzen; leichte Hohlfußbildung.

26. H. J. (47) Sohn von (21), 17 Jahre; 3 pendelnde Fibrome, 2 Pigmentnaevi, Senkfüße.

27. K. J. (48) Tochter von (21), 15 Jahre; mehrere Pigmentnaevi; leichte Hohlfußbildung.

28. F. J. (49) Tochter von (21), 12 Jahre; o. B.

29. B. J. (50) Sohn von (21), 2 Jahre; o. B.

30. L. J. (51) Tochter von (22), 8 Jahre; mehrere Pigmentnaevi; leichte Hohlfußbildung.

31. G. St. (52) Sohn von (24), 8 Jahre; o. B.

32. Gi. St. (53) Tochter von (24), 5 Jahre; o. B.

33. U. J. (54) Tochter von (25), 19 Monate; o. B.

Die blutsverwandtschaftliche Verbindung des unter A. zusammengefaßten Personenkreises mit den unter B. und C. zusammengefloßenen besteht nach jeder Seite nur durch die Mütter der unehelichen Eltern des Probanden, also auf beiden Seiten nur durch einen Elter. Die anamnestischen Angaben über diese beiden Frauen (2), (6) enthalten nichts über etwa vorhanden gewesenen Anomalien des Recklinghausen-Symptomenkomplexes oder sonstiger Mißbildungen. Wir haben somit keinen Anhalt für einen erblichen Zusammenhang der in den drei Familiengruppen A., B. und C. gefundenen Anomalien und müssen die drei Verwandtschaftskreise für die Frage der Vererbung getrennt behandeln.

Die Zusammenstellung zeigt deutlich, daß in der Verwandtschaft von seiten der Mutter, Gruppe C., die uns interessierenden Anomalien verschwindend gering sind gegenüber der Fülle, mit der sie in der Verwandtschaft des Vaters, den Gruppen A. und B., auftreten.

Bemerkenswert ist jedoch, daß bei vier Kindern der Halbgeschwister der Mutter sich mehrere Muttermäler finden und daß die Pigmentanomalie bei diesen Kindern mit anderen Anomalien (dreimal leichte Hohlfußbildung (46), (48), (51) und einmal pendelnde Fibrome (47) vergefellschaftet ist, während die übrigen Kinder vollkommen frei sind. Auffallend ist ferner, daß von den neun Geschwisterkindern nicht weniger als drei leichte Hohlfußbildung zeigen. Dieses häufige Auftreten der Mißbildung spricht für eine

erbliche Genese, doch haben wir keinen Beweis dafür, daß auch das Erbgut der Mutter des Probanden damit belastet gewesen ist, da sie nur die Halbwchwester eines Elter dieser war und die anamnестischen Erhebungen bei ihr hierfür keinerlei Anhaltspunkte ergaben. Auch fanden sich bei den Halbgeschwistern der Mutter keine Anzeichen für eine erbliche Belastung. Wir haben somit keinerlei Beweis dafür, daß im Erbgut der Mutter eine Anlagestörung vorgelegen hat, und sie könnte höchstens als latente Trägerin einer Keimanomalie in Betracht kommen. Der unter C. zusammengefaßte Personenkreis scheidet also für die Frage der Vererbung der Recklinghausen'schen Krankheit aus.

Ganz anders ist das Ergebnis unserer Untersuchung bei den Verwandten von seiten des Vaters, den unter A. und B. zusammengefaßten Familien.

Bei dem Stiefvater des Vaters (4) liegt, da unter den Hauttumoren keine Nerventumoren zu erkennen waren, wenn wir der Einteilung von J o ft folgen, zum mindesten eine schwere Abortivform der Recklinghausen'schen Erkrankung vor. Wir kamen daher auf den Gedanken, daß er vielleicht doch der wirkliche Großvater des Probanden sein könne. Unser Verdacht wurde noch durch die Aussage der Tochter, daß der Vater es mit der ehelichen Treue nicht so genau genommen habe, und durch den Umstand, daß die Eltern aus derselben ländlichen Gegend stammen und sich von Kind auf kannten, bestärkt. Auf eine durch die zuständige Fürsorgestelle eingezogene Erkundigung lehnt der Stiefvater die Vaterschaft zwar energisch ab, doch wird uns auch von dieser Stelle mitgeteilt, daß bei dem Geisteszustand des Mannes die Aussage mit Vorsicht zu bewerten sei. Da uns aber der sichere Beweis fehlt, können wir für unsere Untersuchung den Verdacht der Vaterschaft nicht aufrecht erhalten.

Bei der verstorbenen Mutter des Vaters (2) sollen nach Aussage der Tochter keine Hautveränderungen oder sonstige Anomalien bestanden haben, die für eine Recklinghausen'sche Erkrankung sprechen könnten. Sie scheidet also nach der Anamnese aus als die Erbträgerin der in der Verwandtschaft des Vaters so massenhaft

gefundenen Anomalien, und fehlt somit die Brücke für den erblichen Zusammenhang der krankhaften Anlagen in den unter A. und B. zusammengefügten Familiengruppen. Wir haben daher für die Frage der erblichen Genese der gefundenen Anomalien die Verwandtschaft des Vaters zu unterteilen in die beiden Familienkreise, A. den Probanden, den Vater mit den Geschwistern des Probanden einerseits und B. den Stiefvater, die Halbgeschwister des Vaters und deren Kinder andererseits.

I. Die unter A. aufgeführten Untersuchten.

Bei dem Probanden (39) handelt es sich um eine Neurofibromatosis Recklinghausen, bei der die periphere und zentrale Form vergesellschaftet sind. Für die periphere Form ist das Krankheitsbild eindeutig durch die Veränderungen an der Haut, wo wir die vier Kardinalsymptome der Recklinghausenschen Krankheit finden. Als Hinweis für die zentrale Form dienen die nachweisbaren Reflexveränderungen, der Schwachsinns, die temporale weißliche Verfärbung der Papille und die Encephalographie. Die Luftfüllung der Ventrikel erfolgte vielleicht deshalb nicht, weil eine zentrale Geschwulstbildung den freien Liquorabfluß behindert und durch einen ventrikelartigen Verschuß den Lufteintritt verhindert. Es fanden sich ferner folgende bei dem Recklinghausen-Symptomenkomplex häufiger anzutreffende Anomalien: zahlreiche Pigmentnaevi, Veränderungen am Skelettsystem und Augenanomalien. Alle diese Mißbildungen in Verbindung mit der peripheren und der zentralen Recklinghausenschen Erkrankung beweisen, daß bei dem Probanden eine sehr schwere Störung des Keimplasmas vorliegt, die neben Keimanomalien für das Ektoderm auch solche für das Mesoderm betroffen hat.

Der Vater des Probanden (II) hat mehrere pendelnde Fibrome, die eins von den vier Kardinalsymptomen der Recklinghausenschen Krankheit sind. Ferner fanden sich bei ihm Naevi vasculosi und Hohlfußbildung. Von den Hauttumoren wurde keine histologische Untersuchung vorgenommen. Da es sich bei dem Alter des Mannes eventuell um einfache Hautausstülpungen handeln

könnte, lassen wir die Frage offen, ob bei dem Vater auf Grund der multiplen Fibrome eine monosymptomatische Abortivform der Recklinghausenschen Erkrankung angenommen werden kann. Immerhin zeigen die gefundenen Anomalien, daß eine Störung im Keimplasma vorgelegen hat.

Unter den Geschwistern des Probanden findet sich bei der ältesten Schwester (38) und dem jüngsten Bruder (43) nur je ein Pigmentnaevus, der in dieser Häufigkeit auch bei Gefunden gefunden wird. Es ist jedoch zu beachten, daß dieser Bruder erst 14 Jahre alt ist und bei ihm sehr wohl noch Recklinghausen-Symptome, vor allen Dingen Tumoren der Haut, auftreten können. Das gleiche gilt auch von dem zehn Tage alten Kind (55) des anderen Bruders, bei dem keine Anomalien gefunden wurden.

Bei den übrigen Geschwistern sind zwar auch keine ausreichenden Symptome für die Annahme einer Abortivform der Recklinghausenschen Erkrankung vorhanden, doch weisen die gefundenen Anomalien bei dem Bruder (40) mehrere Pigmentnaevi und drei Fibrome, bei einer Schwester (41) mehrere Pigmentnaevi und deutliche Hohlfüße und bei der anderen Schwester (42) viele deutlich erhabene Pigmentnaevi und kurze plumpe Daumen deutlich darauf hin, daß bei ihnen eine, wenn auch nur weniger schwere Störung im Keimplasma vorhanden gewesen ist.

Überblicken wir noch einmal das Ergebnis der Untersuchung der unter A. zusammengeflochtenen Familie, so sehen wir, daß in dieser Familie es zur Ausbildung eines schweren peripheren und zentralen Recklinghausen mit noch weiteren Komplikationen gekommen ist. Beim Vater und drei Geschwistern des Kranken beweisen die gefundenen Anomalien, daß auch hier eine Störung im Keimplasma sicher vorgelegen, sich aber nicht so sehr ausgewirkt hat, daß die entstandenen Anomalien auch nur in einem Falle als eine Abortivform der Recklinghausenschen Krankheit sicher angesehen werden können. Zwei weitere Geschwister des Kranken haben keine Anomalien. Die beim Vater vorhandene Keimanomalie hat sich auf vier von seinen sechs Kindern, und zwar bei einem in

besonders schwerer Form vererbt. Es liegt also ein dominanter Erbgang vor.

II. Die unter B. aufgeführten Personen.

Der Stiefvater des Vaters (4) hat drei von den Kardinalsymptomen der Recklinghausenschen Krankheit, nämlich multiple Fibrome, kleine und große Recklinghausen-Flecke, ferner war er wenig intelligent und von Jugend auf ein Sonderling. Es handelt sich bei ihm nach den Erscheinungen an der Haut um eine schwere Abortivform eines Recklinghausen, bei dem zugleich auch eine zentrale Störung vorliegt. Weiter wurden noch als Komplikationen viele Naevi vasculosi, Naevi pigmentosi und absteigende Schulterblätter gefunden.

Die beim Stiefvater vorhandenen Anomalien haben sich in erheblichem Maße auf seine vier Kinder vererbt. Sein Sohn (13) hat ebenfalls multiple Fibrome und kleine und große Recklinghausen-Flecke. Er wurde dazu von seinem Vater als „sonderbarer Mensch“ bezeichnet. Wir finden bei ihm die gleiche Störung wie beim Vater. Bei den übrigen drei Kindern sehen wir bei allen multiple Fibrome, und alle drei haben absteigende Schulterblätter, ein Sohn (12) hat dazu über 40 Naevi vasculosi, eine Tochter (14) hat 18 Naevi pigmentosi und ist ein Sonderling, und die andere Tochter ist in der Schule einmal nicht mitgekommen. Auf Grund der multiplen Fibrome und der mit ihnen kombinierten anderen Anomalien können wir auch bei diesen Kindern eine Störung im Keimplasma annehmen, die zur Entwicklung einer Abortivform geführt hat, welche bei den beiden Töchtern neben den an der Haut aufgetretenen Erscheinungen auch zentrale Störungen vermuten läßt.

Von den vier Geschwistern hat nur einer (12) Nachkommen, und zwar sechs Kinder, von denen der älteste Sohn (31) vom Arzt seines Truppenteils untersucht wurde. Er hat 4 Naevi pigmentosi.

Der nächstältere untersuchte Sohn (32) ist 19 Jahre alt. Er hat multiple Fibromata pendula, 6 Naevi pigmentosi, dazu Hohlfüße und beiderseits eine kurze, plumpe erste Zehe, Akne-Pusteln und Comedonen, absteigende Schulterblätter. Auch bei ihm sind wir

wegen der Häufung der Anomalien in Verbindung mit einem Kardinalsymptom berechtigt, eine Abortivform anzunehmen.

Es folgt dann eine 12 Jahre alte Tochter (33), bei der sich ein gestieltes Fibrömchen, 9 Pigmentnaevi, Prognathie, unregelmäßige Zahnstellung im Unterkiefer, stark abstehende Schulterblätter fanden und die in der Schule einmal nicht mitgekommen ist. Der erhobene Befund beweist, daß auch bei ihr eine Störung der Keimanlage vorgelegen hat, doch reichen die Symptome nicht aus, um eine Abortivform zu diagnostizieren. Es ist hier das Alter des Kindes zu beachten, denn es kann sich sehr gut um einen Fall handeln, der sich später noch weiter entwickelt.

Der folgende 11 Jahre alte Sohn (34) hat vier große Recklinghausen-Flecke neben einigen kleinen Pigmentnaevi. Es handelt sich bei ihm um eine monosymptomatische Abortivform, die Siemens bei Kindern als Jugendform bezeichnet, da weitere Symptome im Laufe der Entwicklung noch auftreten können.

Eine Tochter von 9 Jahren (35) hat keins von den vier Kardinalsymptomen, doch weisen die bei ihr gefundenen Anomalien, abstehende Schulterblätter und leichte Hohlfußbildung darauf hin, daß evtl. eine Störung im Keimplasma vorhanden gewesen ist.

Bei der jüngsten, 6 Jahre alten Tochter (36) wurde keine Anomalie gefunden.

Die Untersuchung der unter B. zusammengefaßten Verwandtschaft ergibt, daß eine Abortivform der Recklinghausenschen Krankheit in drei Generationen auftritt. Der Großvater, der mit peripheren und zentralen Störungen behaftet ist, vererbt die Anomalien auf seine vier Kinder. Ein Sohn hat die gleichen drei klassischen Symptome der Recklinghausenschen Krankheit wie der Vater, doch nicht so stark ausgeprägt wie bei diesem. Die übrigen drei Kinder sind nur mit einem klassischen Symptom, nämlich multiplen Fibromen behaftet. Diese drei haben ebenfalls abstehende Schulterblätter wie der Vater, ein Sohn über 40 Naevi vasculosi und eine Tochter 18 Naevi pigmentosi. Von den beim Vater auf zentrale Störung hinweisenden Symptomen finden wir bei dem schwerer behafteten Sohn und einer Tochter, daß sie Sonderlinge

sind, und die andere Tochter ist anscheinend nicht intelligent, da sie in der Schule einmal zurückgeblieben ist. Von den vorhandenen sechs Enkeln (Kinder des weniger erkrankten Sohnes) wurden fünf untersucht. Bei zwei fanden wir ebenfalls eine monosymptomatische Abortivform, zwei weitere hatten zwar keine Kardinalsymptome, doch fanden sich mehrere zu den Komplikationen der Recklinghaufenschen Krankheit zu rechnende Anomalien. Bei der Jugend dieser Kinder, 9 und 12 Jahre, können zu den vorhandenen Anomalien noch Recklinghausen-Symptome hinzutreten. Nur die jüngste, erst 6 Jahre alte Enkelin war ohne pathologischen Befund. Bei den Enkelkindern zeigt sich deutlich, daß mit steigendem Alter die Anomalien zunehmen. Auffallend häufig finden wir bei den untersuchten Personen absteigende Schulterblätter, ein Symptom, das vielleicht auf einer trophischen Störung der Muskulatur beruht, und mit den übrigen Recklinghaufenschen Symptomen in Parallele gesetzt werden kann. In der Literatur haben wir dieses Symptom bei der Recklinghaufenschen Krankheit noch nicht erwähnt gefunden. Die Abortivform hat sich von dem Großvater in den beiden folgenden Generationen dominant vererbt, außerdem sehen wir, daß sie in der Deszendenz schwächer in Erscheinung tritt.

Zusammenfassung.

1. Die Recklinghaufensche Krankheit ist kein einheitliches Krankheitsbild. Sie gehört zu den Spongioblastosen und wird heute aufgefaßt als Folge einer keimplasmatischen Störung, die in erster Linie Erbinheiten für das Ektoderm betrifft, daneben aber auch solche für das Mesoderm und Entoderm betreffen kann.

2. Die Erbllichkeit der Recklinghaufenschen Krankheit ist allgemein anerkannt, doch herrscht keine einheitliche Auffassung über den Erbgang, da dominante und nicht dominante Fälle im Krankheitsgeschehen wechseln und häufig auch sporadisches Auftreten beobachtet wird.

3. Wir haben die Sippe eines Recklinghausen-Kranken, 31 Blutsverwandte des Probanden, untersucht. Die Eltern des Kranken sind beide uneheliche Kinder. In der Aszendenz besteht somit nach

beiden Seiten die blutsverwandtschaftliche Verbindung nur je durch einen Elter. Die Anamnese für beide verstorbenen Mütter der unehelich geborenen Eltern ergibt keinen Anhalt dafür, daß Recklinghausen-Symptome oder sonstige Anomalien bei ihnen vorhanden gewesen sind. Wir haben daher die Sippe für die Frage der Vererbung der Recklinghausenschen Erkrankung aufgeteilt in folgende drei Gruppen:

- A. Proband, sein Vater, seine Geschwister und das Kind eines Bruders.
- B. Stiefvater des Vaters, vier Halbgeschwister des Vaters und deren Kinder.
- C. Stiefvater der Mutter, fünf Halbgeschwister der Mutter und deren Kinder.

In der Gruppe A. finden sich zwar beim Vater und drei Geschwistern des Kranken Anomalien, die auf eine vorhanden gewesene Störung im Keimplasma hinweisen, doch reichen die Symptome nicht aus, um auch nur eine Abortivform der Recklinghausenschen Erkrankung annehmen zu können. Ein Kind leidet an einem schweren peripheren und zentralen Recklinghausen mit Schwachsinn. Wir sehen also, daß in der Gruppe A. eine Störung im Keimplasma vorliegt, wie wir sie bei der Recklinghausenschen Erkrankung annehmen müssen, die beim Vater und drei Kindern zur Bildung von Anomalien geführt hat, welche uns im Recklinghausen-Symptomenkomplex als Symptome II. Ordnung bekannt sind. Bei einem Kind hat die Störung einen ausgeprägten Recklinghausen zur Folge gehabt. Zwei Kinder haben keine Anomalien. Die beim Vater vorhandene Keimanomalie hat sich auf vier von seinen sechs Kindern, und zwar bei einem in besonders schwerer Form, vererbt. Es liegt also ein dominanter Erbgang vor.

In der Gruppe B. fanden wir bei dem Stiefvater des Vaters eine schwere Abortivform der Recklinghausenschen Erkrankung, die sich in der ersten Generation auf alle vier Kinder vererbt. In der zweiten Generation wurden von sechs vorhandenen Enkeln fünf untersucht. Zwei Enkelkinder wiesen wieder eine Abortivform auf, zwei weitere, unter zwölf Jahre alte Kinder hatten mehrere als

Komplikationen oder Nebenerscheinungen der Recklinghausenschen Krankheit zu bewertende Anomalien, und ein nur sechs Jahre altes Kind war ohne krankhaften Befund. Die Abortivform hat sich in diesem Familienkreis dominant vererbt, wobei die Symptome in der Deszendenz in einer schwächeren Form in Erscheinung getreten sind.

In der Gruppe C. fanden sich keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Störung im Sinne der Recklinghausenschen Erkrankung.

Wir machen also die interessante Beobachtung, daß innerhalb einer Sippe in zwei Familiengruppen Recklinghausensche Erkrankungen unabhängig voneinander vorliegen. Die vorhandene keimplasmatische Störung hat sich in beiden Fällen dominant vererbt.

Herrn Prof. Dr. Pohlisch gestatte ich mir für die Überlassung der Arbeit und für die Übernahme des Referates sowie Herrn Oberarzt Dr. med. habil. Panse für die bei der Ausarbeitung erteilten Ratschläge und für die Durchsicht der Arbeit meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Literaturangabe:

Adrian: Bruns Beitr. z. klin. Chir. Bd. 31, 1901; Ztbl. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. 6, 1903. — Ball: Deutsch. Z. Nervenheilk. Bd. 63, 1920. — Bielschowsky: J. Psychol. u. Neurol. Bd. 35, 1927; Z. Neur. Bd. 25, 1914. — Bilger: Diff. Tübingen 1931. — Blotvogel: Derm. Wschr. Bd. 11, 1933. — Bürkle de la Camp: Arch. f. klin. Chir. Bd. 167, 1932. — Buschke: Arch. f. Derm. u. Syph. Bd. 132, 1921. — Curtius u. Stempel: Derm. Ztschr. Bd. 51, 1928. — Fischer: G. A.: Derm. Wschr. Bd. 84, 1927; Arch. f. Dermatol. Bd. 152, 1926. — Fischer: Ztbl. f. Haut. u. Geschl.-Kh. Bd. 17; Arch. f. Derm. u. Syph. Bd. 134, 1921. — Foerster u. Gaget: Z. Neurol. Bd. 138, 1932. — Frangenheim: Dtsch. Z. Chir. Bd. 225, 1930. — Gamper: J. Psychol. u. Psychiatr. Bd. 39, 1929. — Heine: Zieglers Beitr. pathol. Anat. Bd. 78, 1927. — Henke: Arch. f. Derm. u. Syph. Bd. 143, 1923. — Herxheimer-Roth: Beitr. z. pathol. Anat. u. z. allg. Pathol. Bd. 58, 1914. — Hoekstra: Virch. Arch. f. pathol. Anat. u. Pphysiol. Bd. 237, 1921. — Hundemer: Diff. München 1930. — Jadassohn: Handb. d. Haut- u. Geschl.-Kh. Bd. XII/2, 1932. — Jordan: Arch. f. Dermat. Bd. 18, 1926. — Jost: Derm. Zbl. Bd. 18, 1926. — Katzenstein: Virch. Arch. Bd. 286, 1932. — Kaufmann: Handbuch d. Haut- u. Geschl.-Kh. Bd. 4, 1933. — Meirowsky u. Bruck: Münch. med. Wschr. 1921. — Meirowsky: Handb. f. Haut- u. Geschl.-Kh. Bd. 4, 1933; Köln. Dermat. Gesellsch. Sitz. v. 31. 7. 1931; Arch. f. Derm. u. Syph. Bd. 127, 1919. — Meiß: Dtsch. Z. Nervenheilk. Bd. 131, 1933. — Mosbacher: Diff. München 1925; Psychiatr. neurol. Wschr. Bd. 29, 1927; Fortschr. Neurol. u. Physiol. Bd. 3, 1931. — Orzechowsky u. Noricki: Z. Neur. Bd. 11, 1912. — Recklinghausen, v.: Festschr. f. R. Virchow, 1882. — Saalfeld: Handb. d. Haut- u. Geschl.-Kh. Bd. 12, 1932. — Schnitzler: Diff. Berlin 1918. — Siemens: Arch. f. Derm. u. Syph. Bd. 150, 1926; Derm. Zeitschr. Bd. 46; Virch. Arch. Bd. 260, 1926; Handb. f. Haut- u. Geschl.-Kh. Bd. 3, 1929. — Struwe u. Steuer: Ztbl. f. Allg. Path. u. path. Anat. Bd. 50, 1931. — Stalman: Virch. Arch. Bd. 289, 1933. — Tannhauser: Klin. Wschr. Bd. 5, 1926. — Thibierge: Ref. Arch. f. Derm. u. Syph. Bd. 50, 1899. — Verocay: Zieglers Beitr. z. allg. Pathol. Bd. 49, 1910.

Lebenslauf.

Ich wurde geb. am 15. Okt. 1893 in Zweibrücken als Sohn der Eheleute Wilhelm Hall und Margarethe, geb. Plaum. Nach Besuch der Volksschule besuchte ich bis August 1914 die Hindenburg-Schule in Aachen. — Ich trat dann als Kriegsfreiwilliger ins Heer ein, war von 1914 bis 1918 an der Front und wurde November 1918 als Leutnant der Reserve entlassen. Anschließend studierte ich bis 1920 in Bonn und bis 1922 in Marburg Zahnheilkunde. In Marburg bestand ich 1922 das zahnärztliche Staatsexamen und promovierte zum Dr. med. dent. Im Jahre 1923 war ich als Assistent und Vertreter tätig. Im Frühjahr 1924 gründete ich in Kohlscheid eine zahnärztliche Praxis. Wegen der Folgen einer Kriegsbefschädigung konnte ich meinen Beruf als Zahnarzt nicht mehr ausüben. Ich studierte daher vom S.S. 1931 bis S.S. 1935 Medizin in Bonn, wo ich 1932 das Vorexamen und 1935 das Staatsexamen ablegte. 1933 verheiratete ich mich mit Therese Habermann. Vom 1. Dezember 1935 bis 1. Juni 1936 war ich als Medizinalpraktikant in der Med. Univ.-Klinik in Bonn und erhielt am 1. Juni 1936 die Approbation als Arzt.
